

NEUNTE ABHANDLUNG.

PFLANZEN AUS DER STEINKOHL-
FORMATION

VON HERRN A. SCHENK IN LEIPZIG.

Hierzu Taf. XXX—XLV. XLIX, Fig. 1.

Im Folgenden sind Pflanzenreste von den nachbenannten Fundorten beschrieben:

- | | |
|---|--------------------|
| I. Pönn-hsi-hu in Liau-tung, | Provinz Shöngking. |
| II. Sai-ma-ki » » | » Shöngking. |
| III. I-tshóu-fu, | » Shantung. |
| IV. Kai-ping, | » Tshili. |
| V. Yang-kia-fang bei Peking, | » Tshili. |
| VI. Tshing-pu-shan in Tsö-tshóu-fu, . . | » Shansi. |
| VII. Lang-tiën im Kohlenfeld von Lu-shan, | » Hönan. |
| VIII. Gegend von Tshung-king-fu, . . . | » Sz'-tshwan. |
| IX. Hwang-shí-kiang am Yang-tszë, . . | » Hupéi. |
| X. Lui-pa-kóu am Fluss Lui-hö, | » Hunan. |
| XI. Gegend von Shau-tshóu-fu, | » Kwangtung. |
| XII. Tshing-ko-tshwang, | » Shantung. |

I PÖNN-HSI-HU in Liau-tung¹⁾.

FARNE.

NEUROPTERIS BRONGNIART.

1. *Neuropteris flexuosa* BRONGNIART.

Taf. XLV, Fig. 17.

Es liegt mir nur das abgebildete Fiederblättchen mit der Gegenplatte vor, dessen Spitze fehlt.

¹⁾ Dieses kleine Kohlenfeld ist in Bd. II dieses Werkes SS. 102—104 beschrieben. Die Pflanzenreste stammen aus den die Flöze begleitenden dunklen Schieferthonen. — v. R.