

Erklärung zu Tafel 15

ZWEISCHALER VON LO-PING

- 1 a—d. *Liebea sinensis* Frech. (Schon abgebildet in Band IV, Taf. XXI, Fig. 2) = „*Myalina trapezoidalis*“ Kays. ex parte. Lo-ping. p. 115. (a—b 1:1. c. Reconstruction in 3:2.)
2. *Liebea indica* Waag. Lo-ping. Der leere Umriß stammt von *Liebea indica* Waagen und ist eine Kopie nach Waagen. p. 115.
3. *Myalina ampla* Meek u. Hayden. Obercarbon. Montgomery County Illinois. p. 114.
4. *Myalina trapezoidalis* Kays. Lo-ping. p. 114.

MITTLERE DYAS LO-PING

5. *Oxytoma laevicostata*. Netschajew Mittl. Productuskalk. Jabbi, Salt Range. p. 112.
6. *Oxytoma laevicostata* Netschajew Lo-ping. p. 112.
7. *Schizodus rotundatus* Brown. Shi-hwui-yan.  
Pyritische Kohlschiefer der Neodyas Hupéi. p. 194.
8. *Aviculopecten* sp. Ob. Dyas. Aus den Kohlen führenden pyritischen Schichten der Neodyas. Wu-ho-shui in Liau-tung. p. 177.
- 9a, b. *Myalina* cf. *de Geeri* Lundgreen. Ob. Dyas, Wu-ho-shui, Liau-tung. p. 177.

Gez. von Dr. Loeschmann.