

Erklärung zu Tafel 16

NAUTILEEN, GASTROPODEN UND BRACHIOPODEN VON LO-PING

- 1 a, b. *Tainoceras Noetlingi* Frech. Oberster Productuskalk. Zone des *Bellerophon Jonesianus*. Warcha. p. 106.
2. *Tainoceras orientale* Kays. sp. = *Nautilus orientalis* Kayser Lo-ping. Orig. Kayser. p. 106.
3. *Tainoceras mingshanense* Kays. sp. Lo-ping (*Nautilus*). Flachgedrücktes Wohnkammerbruchstück von oben. p. 107.
- 4 a—c. *Gastrioceras Richthofeni* Frech („*Nautilus*“ det. Kayser) Lo-ping. p. 105.
- 5 a—c. *Bellerophon* sp. aff. *B. orientalis* Waag. („*Nautilus an Warthia*“ bei E. Kayser, China IV Taf. 19, Fig. 5) Lo-ping (Steinkern). p. 110.
- 6 a—b. *Bellerophon orientalis* Waag. Mittl. Productuskalk. Jabbi, Salt-Range (Schalenexemplar). p. 110.
- 7 a—c. *Retzia (Hustedia) grandicosta* Dav. = *Retzia compressa* Meek bei E. Kayser, China IV Taf. 22, Fig. 1—4. Mittl. Dyas, Lo-ping. p. 117.
- 8 a—b. *Retzia (Hustedia) grandicosta* Dav. Lo-ping. Orig. z. Richthofen, China IV. Taf. 22, Fig. 3. p. 117.
- 9—11. *Spirifer (Martinia) semiplanus* Waag (= *Spirifer ellipticus* Phill. bei Kayser). Lo-ping. p. 119.
- 10 a—c. Desgl. Mittl. Productuskalk. Koparivalli, Salt-Range. p. 119.
- 11 a, b. Desgl. (= *Sp. ellipticus* Phill.) Lo-ping. p. 119.

Gez. von Dr. Loeschmann.