

Erklärung zu Tafel 18

ORTHIDEN UND ORTHOTHETINEN VON LO-PING

- 1 a—e. *Dalmanella indica* Waagen. a) Lo-ping. b) südlich v. Wutshang, Provinz Hupéi. c) Kalabagh, Salt-Range. p. 120.
2. *Dalmanella subquadrata* Fliegel (= *Orthis Pecosii* Kays. non Marcou) mit Crinoidenwurzel. Dyas. Lo-ping. Neugezeichnetes Original Kaysers in Richthofen, China IV Taf. XXIV, Fig. 1. p. 120.
- 3 a—d. *Derbya Schellwieni* Frech = *Streptorhynchus crenistria senilis* Kays. ex parte. a), b) Lo-ping 2 : 1 (Original E. Kayser). c), d) Kupang auf Timor 3 : 2 (Original E. Beyrichs). p. 125.
- 4 a. *Derbya grandis* Waag. Mittl. Productuskalk. Kopariwalli bei Warcha, Salt-Range. Präparat des Schnabels der Stielklappe. p. 125.
- 4 b—d. *Derbya* cfr. *grandis* Waag. (Schon abgebildet in Bd. IV Taf. XXIII, Fig. 6.) Lo-ping. p. 125.
5. *Meekella Kayseri* Jaek. mscr. (Schon abgebildet in Bd. IV Taf. XXIII, Fig. 8.) Lo-ping. p. 126.
- Zum Vergleich:
6. *Meekella striatocostata* Cox. Ob. Carbon. Kansas-City, Missouri. p. 126.
- 7 a—b. *Streptorhynchus pelargonatus* Schl. Mittlerer Productuskalk. a) Jabbi, Salt-Range. (Der schattierte untere Teil von Lo-ping, die Ergänzung (oben) von Jabbi.) b) Lo-ping. p. 122

Gez. von Dr. Loeschmann.