

Erklärung zu Tafel 28

RETICULARIA UND ATHYRIS AUS DER NEODYAS SÜDCHINAS  
MIT VERGLEICHSTÜCKEN

- 1 a, b Spirifer (Reticularia) inaequilateralis Gem. Dyas, Tung-tze, Kwéi-tshóu. Süd-China. p. 169.
- 2 a—e. Spirifer (Reticularia) Waageni Loczy em. Frech. Neodyas, Tshau-tien. p. 141.  
a), b) Neugezeichnetes Original zu Richthofen China Bd. IV, Taf. 14, Fig. 6 u. 6c.  
c), d) Dieselbe Art von Djulfa, nach Arthaber, Palaeozoicum von Hocharmenien in Beiträge zur Geologie Oesterreich-Ungarns Bd. XII, Taf. 21, Fig. 3.  
e) Dieselbe Art von Lo-ping. p. 141.
3. Spirifer (Reticularia) indicus Waag. Lo-ping.
- 4 a, b. Spirifer (Reticularia) indicus Waag. (= Waageni Loczy). Jerkalo am Lan-tshan-kiang. p. 118, 141, 156.  
a) Ergänzt nach einem Stück von Virgal, Pandschab.  
b) Ergänzt nach einem Exemplar von Fiume Sosio.
- 5 a—e. Athyris protea Abich var. armeniaca Arth. em. Untere Neodyas. p. 176.  
a—c) Djulfa, d—e) Tung-ye.
6. Athyris subtilita Hall. Obercarbon (Coal measures). La Salle Cy. Illinois (Worthen leg. 1888). p. 176.

Gez. von Dr. Loeschmann.