

на пути В. Ф. Ладыгина, обнаруженъ стекловатый базальтъ—мѣстами съ собственной брекчіей,—покоящійся на базальтовой лавѣ, а въ нѣкоторомъ отдаленіи къ югу и съверу, по предгорьямъ, къ преобладающему сланцу примѣшивается и известнякъ. Далѣе къ съверу передъ долиной Боунъ-цаганъ-норъ залегаетъ окраинная грязьда, обнаруживающая на обоихъ склонахъ, при пересѣченіи Дунду-аргалантэ, порфировый туфъ съ незначительнымъ добавленіемъ тоналита, известняка, мезозойскихъ песчаника и глины и кремня; послѣдній монголы добываютъ для собственной надобности.

Озеро Боунъ-цаганъ-норъ довольно обширное—до 60-ти верстъ въ окружности—было обойдено кругомъ. Общая фигура этого соленаго озера, стоявшаго открытымъ въ половинѣ октября, напоминаетъ закругленный треугольникъ, съверо-западная и юго-западная стороны котораго прихотливо изрѣзаны. Вода на столько солона, что ее не пьютъ даже животныя; кромѣ того она обильно выдѣляетъ съроводородъ. Низкій берегъ—солончаки, возвышенный—пески, обсыпающіе котловину озера со всѣхъ сторонъ; съ восточной стороны кромѣ того расположены правильныя поперечныя грязьды, состоящія изъ конгломератоваго щебня. Въ съверо-восточный уголъ озера впадаетъ рѣчка Байдарикъ¹⁾, не задолго передъ тѣмъ принявшая справа Цаганъ-голь. Отсюда же на съверо-западъ вдали, среди предгорій Хангая, виднѣлась гора Гурбанъ-хара-Магнай.

На озерѣ ютилось много пролетныхъ птицъ,—все тѣ же, которыя мною были указаны и раньше. Съ съвера и запада—со стороны пустыни порою приходили хуланы и антилопы (*Gazella subgutturosa*), которыхъ манили прибрежныя заросли камыша, тамариска и саксаула.

Обратно г. Ладыгинъ, не имѣя болѣе въ своемъ распоряженіи времени, въ виду предстоявшей скорой поѣздки, возвратился прежней дорогой.

Пользуясь дневками наши казаки охотились въ ближайшей окрестности за антилопами, а препараторъ Телешовъ уѣзжалъ съ той же цѣлью въ горы Баинъ-цаганъ-ула. Поѣздки Телешова были особенно успѣшны: онъ убилъ пару каменныхъ барановъ, изъ которыхъ одинъ по величинѣ и красотѣ превосходилъ всѣхъ видѣнныхъ и добытыхъ нами во время путешествія. Орнитологическая коллекція также обогатилась интереснымъ мѣстнымъ видомъ горной индѣйки (*Megaloperdix altaica*). Посѣщенныя нами ущелья южнаго

¹⁾ Въ устьѣ—своемъ эта рѣчка разбита на три рукава, достигающихъ по ширинѣ въ общей сложности 6—7 сажень, а въ глубину около одного фута.