

въ Чортэнтан'ѣ раннею весною, Тэтунгъ спокойно, хотя въ то же время величественно, катилъ свои голубыя волны. Бивуакъ экспедиціи болѣе чѣмъ на мѣсяць расположился на луговой террасѣ праваго берега, вблизи той разрушенной наводненіемъ площади, гдѣ подъ тополями укрывались шатры экспедиціи Н. М. Пржевальскаго.

Въ теченіе всего проведеннаго здѣсь времени, мы ежедневно экскурсировали въ окрестныхъ лѣсахъ, охотясь за звѣрями и птицами. Ближайшихъ же нашему бивуаку пернатыхъ, въ особенности красивыхъ фазановъ (*Phasianus Strauchi*), которые частенько въ виду нашихъ палатокъ разгуливали подобно домашнимъ птицамъ, мы старались охранять и не беспокоить. Изъ сосѣдняго лѣса доносились голоса ушастыхъ фазановъ (*Crossoptilon auritum*), рѣже — зеленыхъ сэрмуновъ или франколиновъ (*Ithaginis sinensis*); пѣніе же мелкихъ птичекъ ласкало нашъ слухъ почти ежедневно, въ особенности въ ясное, тихое утро или вечеръ. То же пѣніе птицъ манило скорѣе подъ лѣсную сѣнь, гдѣ бывало, усѣвшись на мху, съ удовольствіемъ, даже больше — съ наслажденіемъ, проводишь нѣсколько часовъ въ наблюденіи надъ ихъ интереснымъ образомъ жизни. Тутъ, вблизи, по стволу могучей ели, скользятъ пищуха-сверчокъ и поползень (*Certhia et Sitta*), рядомъ съ ними монотонно стучитъ черный дятель (*Picus martius*), тамъ, цѣпляясь за вѣточки, съ дерева на дерево перелетаютъ синицы — *Leptoprocne Sophiae*, *Lophobasileus elegans*, *Lophophanes dichroides*, *Periparus Beawani* — тамъ, повыше, гималайскіе клесты (*Loxia curvirostra himalayna*), въ гущинѣ ягодныхъ кустарниковъ спрятались *Carpodacus dubius*, по сосѣдству съ которыми невидимкой прыгаетъ по землѣ или нижнимъ вѣточкамъ крапивникъ (*Troglodytes pallidus*); одновременно изъ глухого лѣса слышится свистъ мѣстнаго рябчика (*Tetrastes Sewerzowi*), которому порою вторятъ голубой и зеленый фазаны. Тамъ и сямъ надъ лѣсомъ и скалами гордо проносятся орлы-бѣркуты или бородатый ягнятникъ.

Наша орнитологическая коллекція скоро пополнилась лучшими обитателями здѣшнихъ лѣсовъ, кустарниковъ и альпійскихъ луговъ. Маммологическая — также обогатилась шкурами оленей, кабарги и летягъ; послѣднія, въ теплые февральскіе вечера, оригинально перемѣщались по вѣтвямъ высокихъ, вѣковыхъ тополей. Ганьсуйская летяга оказалась новой; ее описалъ К. А. Сатунинъ какъ *Sciuropterus Buechneri*<sup>1)</sup>. Здѣсь же добыты и новый видъ мыши (*Mus gan-*

<sup>1)</sup> К. А. Satunin. Neue Nagetiere aus Centralasien. Оттискъ изъ Ежегодника Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, т. VII, 1902. Стр. 3.