

На дальнѣйшемъ нашемъ пути къ главному бивуаку, вблизи восточнаго берега озера, хулановъ паслось особенно много; здѣсь, кромѣ того, опять появились антилопы-оронго, вызывавшія у моихъ юныхъ спутниковъ восторженное удивленіе къ красивымъ формамъ ихъ сложенія, величинѣ и посадкѣ роговъ, а также быстрой и оригинальной побѣжкѣ. Въ наблюденіяхъ за дикими млекопитающими мы незамѣтно приблизились къ лагерю, восточнѣе котораго, на лѣвомъ берегу рѣчки, насъ ожидалъ Ивановъ съ нѣсколькими человѣками казаковъ, чтобы указать намъ мѣсто удобной переправы. Еще нѣсколько минутъ и мы дома: аппетитно ѣдимъ баранину, пьемъ кирпичный чай и оживленно передаемъ впечатлѣніе о совершенной поѣздкѣ.

Озеро Алыкь-норь расположено въ открытой долинѣ, граничащей на сѣверѣ хребтомъ Бурханъ-Будда, а на югѣ горами Ундурь-куку. Не смотря на то, что этотъ прѣсноводный бассейнъ занимаетъ въ окружности около сорока верстъ, онъ кажется сравнительно очень небольшимъ—такъ грандіозенъ масштабъ общаго построенія тибетскаго нагорья. Абсолютная высота озера простирается до 13.370 футовъ. Наибольшая длина его, приходящаяся по сѣверному низменному берегу, пятнадцать верстъ, относительно же ширины и глубины разсматриваемаго бассейна, уже было замѣчено выше.

Цвѣтъ водной поверхности Алыкь-нора былъ крайне непостояненъ; даже не всегда наблюдалась одинаковая окраска, которая зависѣла отъ освѣщенія озера и состоянія его поверхности: чѣмъ спокойнѣе озеро, чѣмъ глаже его поверхность и чѣмъ безоблачнѣе небо, тѣмъ наряднѣе была окраска—голубовато-стального цвѣта; въ противномъ же случаѣ преобладалъ однообразно сѣрый цвѣтъ съ болѣе или менѣе темнымъ оттѣнкомъ.

Что касается до ихтіологической фауны Алыкь-нора, то она не богата разнообразіемъ, по крайней мѣрѣ судя по нашимъ даннымъ, но зато поражаетъ количествомъ. Баснословное обиліе рыбы въ этомъ озерѣ, какъ и вообще во всѣхъ озерахъ, рѣкахъ и рѣчкахъ тибетскаго нагорья, объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что, за исключеніемъ хищниковъ ее вѣроятно съ сотворенія міра никто здѣсь не ловитъ. Въ нашей спиртовой коллекціи изъ Алыкь-нора имѣются маринки (*Schizopygopsis thermalis*, *Sch. malacanthus*) и гольцы (*Nemachilus kungessanus*, *N. crassus*), среди которыхъ послѣдній, по изслѣдованію профессора Харьковскаго университета А. М. Никольскаго, оказался новымъ видомъ.