

что едва допускала возможность движенія по ней бычачьяго каравана. Въ подобныхъ мѣстахъ предпочитаешь идти пѣшкомъ, ведя въ поводу лошадей.

Хребетъ, у южной подошвы котораго приютилась экспедиція, своею восточною окраиною простирается до Чамдо, гдѣ вершиною Зачжи касается вѣчнаго снѣга, въ противоположную же сторону убѣгаетъ еще дальше, вглубь самаго нагорья Тибета. Съ сѣвера его омываетъ верхній Меконгъ, съ юга—правый притокъ послѣдняго—Н'ому-чю съ своей данницей Бар-чю. Этотъ хребетъ намъ удалось прослѣдить на порядочномъ протяженіи и пересѣчь дважды, не считая третьяго второстепеннаго пересѣченія, исполненнаго лишь въ области одного южнаго склона.

Не смотря на свои значительные размѣры—до четырехсотъ верстъ въ длину—разсматриваемый хребетъ, подобно многимъ таковымъ восточнаго Тибета, не имѣетъ у туземцевъ общаго названія; я назвалъ его именемъ Вильяма Вудвиль Рокхила (William Woodville Rockhill), желая тѣмъ самымъ почтить путешественника, котораго я уже не разъ упоминалъ на страницахъ моего труда и который является въ Камѣ моимъ предшественникомъ, столь много поработавшимъ по географіи сѣверо-восточнаго Тибета и въ области его этнографіи давшимъ первыя обстоятельныя свѣдѣнія объ обитателяхъ Кама въ своихъ классическихъ трудахъ: „The Land of the Lamas“, 1891, и „Diary of a Journey through Mongolia and Tibet“, 1894.

„Хребетъ Вильяма Вудвиль Рокхила“ слагается въ мѣстѣ нашего перваго пересѣченія, главнымъ образомъ изъ плотныхъ известняковъ (буро-сѣрыхъ или глинистыхъ зеленовато-сѣрыхъ), кромѣ того изъ мергелей (буро-краснаго песчанистаго или свѣтло-сѣраго пористаго), залегающихъ въ окраинныхъ холмахъ сѣвернаго склона; на восточномъ пересѣченіи этого хребта, у самаго гребня, обнаруженъ трахитъ (грязно-бѣлый съ пиритомъ и охрой) исключительно въ видѣ большихъ и малыхъ обломковъ, сползающихъ на обѣ стороны перевала Мо-ла; а пониже гребня, приблизительно футовъ на двѣсти, на сѣверномъ склонѣ, выступаетъ въ видѣ отдѣльной скалы, треснувшей по всѣмъ направленіямъ, бурый біотитовый трахитъ съ многочисленными крупными выдѣленіями плагіоклаза и санидина и мелкими біотита; на южномъ же склонѣ, въ области средняго пояса горъ, при урочищѣ Бамару, замѣченъ известковый, ноздреватый, свѣтло-красно-бурый туфъ, покрывавшій ложе небольшого ручья, сбѣгавшаго по послѣдовательно расположеннымъ уступамъ.