

запирается мрачными тѣснинами, а съ восточной—кромѣ того и высокимъ каменнымъ порогомъ, съ которымъ Бар-чю яростно сражается, превращаясь при этомъ въ одну сплошную пѣнистую массу, игравшую на солнцѣ цвѣтами радуги. Ревъ и шумъ Барчю'ской стремнины былъ въ состояніи заглушить самый громкій людской голосъ. Обаятельной дикой прелести каскада способствовали также дѣвственные заросли, нависшія съ отвѣсно ниспадавшихъ береговыхъ стѣнъ. Это было любимѣйшее мѣсто моихъ охотничьихъ экскурсій.

По цѣлымъ часамъ я просиживалъ въ сосѣдствѣ стремнины, наблюдая подъ ея монотонный гулъ за жизнью мѣстныхъ пернатыхъ. Чуть только блеснутъ солнечные лучи по скалистымъ стѣнамъ ущелья и вершинамъ хвойныхъ деревьевъ, какъ уже просыпаются птицы и покидаютъ мѣста ночевокъ. Снѣжные грифы, ягнятники бородатые и орлы-беркута дозоромъ понесли надъ вершинами горъ, коршуны и вороны нетерпѣливо закружили надъ бивуакомъ у мѣста закланія барановъ, тогда какъ сороки (*Pica bottanensis*) и черныя вороны (*Corone macrorhyncha levaillanti*), повидимому, спокойно выжидаютъ той же добычи, сидя на сосѣднихъ деревьяхъ; высоко надъ елями паритъ вновь открытый ястребъ (*Accipiter Ladugini*), котораго по временамъ беспокоятъ попутно пролетавшіе сокола, сарычи, галки (*Coleus dauricus major*) и крикливыя клушицы; сверху ущелья волнистымъ полетомъ прилетѣлъ зеленый дятель (*Gecinus guerini*) и съ размаха уцѣпился за пень; на другомъ берегу рѣчки долбитъ высокое стройное дерево другой его собратъ—золотисто-головой (*Picoides funebris*); въ двухъ-трехъ шагахъ отъ наблюдателя невидимкой поднимается по стволу камская пищуха (*Certhia khamensis*); въ гущинѣ кустарниковъ перелетаютъ или прыгаютъ по вѣтвямъ *Trochalopteron Ellioti*, *Janthocincla maxima*, бурая кустарница (*Kaznakowia Kozlowi*) и дроздъ Кесслера (*Merula Kessleri*); рядомъ съ ними можно было нерѣдко вспугнуть рябчика (*Tetrastes Sewerzowi*); повыше—цѣпляются въ хвоѣ всевозможныя синицы: хохлатыя—*Periparus Beawani*, *Lophophanes dichroides*, маленькія изящныя—*Leptorocile Sophiae*, *L. obscura*, *Lophobasileus elegans*, *Rocile songara*, нѣсколько видовъ пѣночекъ и золотистолобый король; изрѣдка, въ стайкахъ, перелетали съ одной стороны ущелья на другую гималайскіе клесты (*Loxia curvirostra himalayana*) и каменные голуби (*Columba rupestris*); тамъ и сямъ перемѣщаются на скалахъ или на деревьяхъ, помахивая хвостиками, красивыя горихвостки *Chaemarrhornis leucoccephala*, *Ruticilla schisticeps*, *R. rufiventris*; рѣже показывалась на глаза *Nemura cyanura*; въ гущинѣ можжевельниковъ