

Этотъ переваль, въ истекавшемъ году, для меня былъ послѣдній, а сколько ихъ оставлено за собою съ начала лѣта, со времени вступленія экспедиціи на нагорье Тибета? На этотъ вопросъ сразу даже трудно и отвѣтить. Всего лучше открыть четвертый листъ съемки и по маршруту экспедиціи мысленно слѣдовать за ней, останавливаясь на цифрахъ высотъ точекъ, измѣренныхъ барометромъ, и тогда только можетъ явиться нѣкоторое представленіе о той профили восточнаго Тибета, по которой шагъ за шагомъ медленно тащилась наша экспедиція.

Взглянувъ еще разъ на обширную панораму при-меконгскихъ горъ, мы начали спускаться по крутой, узкой тропинкѣ, убѣгавшей въ долину рѣчки Рон-чю, впавшей затѣмъ въ Рэ-чю. На послѣднемъ своемъ ночлегѣ, памятномъ по обилію обезьянъ, мы были встрѣчены обитателями лхадоскаго округа, а на слѣдующій день, двадцатаго ноября, въ восемь часовъ утра, въ ихъ обществѣ уже вступили въ селеніе Лун-ток-ндо, гдѣ экспедиція основалась на зимовку.

Въ заключеніе нѣсколько словъ объ осеннемъ пролетѣ птицъ.

Первыя единичныя отлетныя пернатые стали обнаруживаться въ Камѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ Тибета, въ половинѣ августа, причемъ за отсутствіемъ болотъ или озерныхъ бассейновъ, почти не было отмѣчено ни плавающихъ, ни голенастыхъ. Большинство пролетныхъ птицъ принадлежало къ отряду воробьиныхъ. Самый пролетъ, вообще очень бѣдный, прошелъ, можно сказать, незамѣченнымъ. Только благодаря значительному району, который охватила экспедиція, и постояннымъ наблюденіямъ и экскурсіямъ, представлялась возможность услѣдить за немногими отбывавшими пернатыми странниками. Всѣ замѣтки нынѣшней осени въ этомъ отношеніи сводятся къ слѣдующему.

16-го августа, при рѣчкѣ Ба-чю, стали группироваться въ небольшія отлетныя стайки сѣрая плиски (*Motacilla hodgsoni*), а на другой день уже начали ее оставлять и направляться къ югу; 20-го замѣчены улиты-черныши (*Totanus ochropus*), 21-го стрижи (*Cypselus pacificus*), ласточки (*Chelidon cashmeriensis*) и прежнія сѣрая плиски; на слѣдующій день ласточки каменные (*Cecropis daurica*); 24-го розовыя щеврицы (*Anthus rosaceus*), *Chaemarrhornis leucoccephala*; 29-го пѣночки (*Phylloscopus*) и краснохвостки (*Ruticilla schisticeps*).

1-го сентября медленно подвигались къ югу изящныя пѣночки-корольки (*Phylloscopus reguloides*), 6-го галочки стали табуниться, 7-го и 8-го, періодически стаями, неслись жаворонки (*Calandrella brachy-*