

Летяга (*Pteromys melanopterus*) или „тэмзи“, называя ея по-тибетски, раза въ три-четыре превосходитъ своими размѣрами подобнаго или родственнаго ему европейскаго звѣрка; ея темная, длинная шерсть, пушистый хвостъ и широкія летательныя перепонки производятъ въ высшей степени внушительный видъ, въ особенности когда тэмзи перелетаетъ съ дерева на дерево. Способность перемѣщаться у камской летяги замѣчательная: она летитъ и въ наклонномъ, и въ горизонтальномъ положеніяхъ, причемъ хвостъ, повидимому, способствуетъ регулированію полета, какъ руль.

По свѣдѣніямъ туземцевъ, описываемая летяга живетъ парами въ дуплистыхъ деревьяхъ, гдѣ устраиваетъ себѣ гнѣзда подобно птицѣ. Течка у этихъ звѣрковъ происходитъ въ первыхъ двухъ третяхъ января мѣсяца; молодые же, по два или даже по три, появляются на свѣтъ въ концѣ марта.

Питается тэмзи, судя по желудкамъ, вскрытымъ у препарированныхъ экземпляровъ, сѣменами древовиднаго можжевельника, хотя лхадоскіе охотники увѣряли насъ, что летяга также охотно поѣдаетъ мелкихъ птичекъ и мышей, которыхъ мастерски излавливаетъ.

Слѣдующій звѣръ, заставляющій всего дольше остановиться на себѣ, есть „джара“ или китайскій яманъ (*Nemorhoedus khamensis* sp. nov.),—среднее между антилопой и козломъ. Такъ какъ представители этого интереснаго рода ни въ одно изъ путешествій покойнаго Н. М. Пржевальскаго не наблюдались, за исключеніемъ „горной антилопы“, обитаемой въ горахъ Муни-ула, равно не наблюдались и его преемниками до времени послѣдней нашей экспедиціи, а слѣдовательно объ нихъ никогда и не упоминалось, то въ ожиданіи, что этотъ добытый нами новый видъ крупнаго млекопитающаго будетъ обработанъ кѣмъ либо изъ специалистовъ-зоологовъ въ научныхъ трудахъ моей экспедиціи, я рѣшилъ предварительно описать его на страницахъ настоящей книги.

Характерные признаки джара слѣдующіе: массивное тѣлосложеніе, сравнительно небольшая голова, длинныя уши, щетинообразная длинная шерсть, переходящая на шеѣ въ еще болѣе грубую — настоящую гриву и присутствіе на брюхѣ и бокахъ мягкаго густого подшерстка. Общій видъ и окраска самца почти не отличаются отъ таковыхъ самки. Вотъ ихъ описаніе. Довольно острая голова покрыта черной короткой шерстью, которая замѣтно удлиняется къ основанію головы. Ротъ окаймленъ свѣтло-серебристой полоской, надъ которой по щекамъ лежатъ клиновидныя сѣровато-рыжія пятна, а на носу у самки имѣется, хотя и не всегда, свѣтлый равнобедренный треугольничекъ, обращенный