

общей рыжеватой окраски которыхъ внутри просвѣчиваетъ желтая. Зеркало, равно переднія и заднія ноги ржаво-рыжія сплошь; продольныя черныя полосы, подобно спинному ремню, проходящія спереди ногъ, отъ колѣнъ почти до копытъ, какъ это имѣется у большинства сычуаньскихъ экземпляровъ *Nemorhoedus*'овъ, сбора М. М. Березовскаго, — отсутствуютъ. На колѣняхъ переднихъ ногъ имѣются мозоли. Черныя удлиненныя копыта очень крѣпкія.

Въ цѣломъ, *Nemorhoedus khamensis* представляетъ собою довольно наряднаго звѣря, особенно, когда быстро несется по опушкѣ лѣса; голова его въ это время слегка приподнята вверхъ, а серебристая грива, ниспадая по сторонамъ, замѣтно выдѣляется отъ раздуванія встрѣчнымъ вѣтромъ.

Въ нашей коллекціи, поступившей въ даръ Зоологическому музею Императорской Академіи Наукъ, имѣются четыре отличныхъ шкуры этого звѣря; кромѣ того столько же череповъ и одинъ полный скелетъ самца. Два экземпляра джара приобрѣтены собственною охотою, а два другихъ — путемъ покупки у охотниковъ лхадосцевъ.

Размѣры и вѣсъ джара (*Nemorhoedus khamensis* sp. nov.).

Подраздѣленіе половъ.	Длина отъ вершины рта до основанія хвоста.		Длина черепа по лицевой сторонѣ, до основанія роговъ.		Длина хвоста безъ волосъ.		Высота звѣря.				Объемъ у груди.		Вѣсъ въ пудахъ.
	Фут.	Дюйм.	Фут.	Дюйм.	Фут.	Дюйм.	У переднихъ ногъ.		У заднихъ ногъ.		Фут.	Дюйм.	
							Фут.	Дюйм.	Фут.	Дюйм.			
Молодой самецъ (♂)	5	4.5	—	10.8	—	4.5	3	3.4	3	7.5	3	10.0	7
Врослая самка (♀)	5	9.5	—	10.5	—	3.5	3	8.5	4	0.5	3	11.2	7

Туземцы спеціально на джара почти не охотятся, хотя, конечно, не упускаютъ случая стрѣлять въ этого звѣря. Помимо мяса, туземные охотники цѣнятъ въ джара его прочную шкуру, идущую главнымъ образомъ на парныя дорожныя сумы богатыхъ тибетскихъ всадниковъ, распространенныя преимущественно среди дэргэ'сцевъ.

По свѣдѣніямъ, добытымъ отъ туземцевъ, а также отчасти и согласно нашимъ личнымъ наблюденіямъ, весною, джагуръ держится одиночками и въ весьма трудно-доступной мѣстности. Природные бал-