

заходятъ, слѣдующіе два вида лука — *Allium Przewalskianum* и *A. chrysocephalum* — въ особенности послѣдній. Тминъ (*Carum Carvi*), который какъ и мытникъ простирается значительно выше; *Goldbachia laevigata*, хармыкъ (*Nitraria Schoberi*), *Myricaria germanica* v. *alopercuroides*, *Reaumuria kaschagarica*, *R. Przewalskii*), мышьякъ (*Thermopsis lanceolata*), *Triglochin palustre*, *T. maritimum*; второй переходитъ въ средній поясъ; погремущки (*Silene conoideae, tenuis*), колючка или перекати-поле (*Salsola Kali*), лебеда (*Atriplex hortensis*), можжевельникъ (*Juniperus excelsa*), гусиный лукъ (*Gagea pauciflora*), сардана (*Hedysarum miltjugum*); послѣднія два растенія восходятъ до 13.000 футовъ надъ уровнемъ моря; острець (*Carex Moorcroftii*), житнякъ (*Bromus alaicus*) *Agropyrum longearistatum*, *A. imbricatum* и тибетская мурава (*Poa tibetica, P. attenuata*).

Въ области альпійскихъ кустарниковъ (отъ 12.000 до 14.000 футовъ надъ моремъ): горицвѣтъ (*Adonis coerulea*), мышій горохъ (*Astragalus Kuschakewiczi*), жимолость (*Lonicera hispida*), прорѣзная трава (*Leontopodium alpinum*), воробьиное просо (*Anaphalis lactea*), *Werneria Ellisii*, желтуха (*Senecio campestris*), горечавки (*Gentiana siphonantha, G. barbata*¹⁾ *G. glomerata, var. Kozlowi, G. pseudoaquatica, G. Przewalskii*), *Przewalkia tangutica*, божьи ручки (*Primula nivalis*), мытники (*Pedicularis lasiophrys, P. Przewalskii*),²⁾ медовикъ (*Dracocephalum heterophyllum*), *Saxifraga tangutica*³⁾, касатикъ (*Iris tigridia*), *Polygonum Bistorta*, ревень (*Rheum spiciforme*), *Cheiranthus roseus*, *Smelowskia tibetica*, *Braya rosea var. bifallora*, *Eutrema Edwardsii*, маткина душка (*Viola tianschanica*), *Pennisetum flaccidum*, песчаный пырей (*Koeleria cristata*), головастикъ (*Corydalis stricta*) и осока (*Kobresia Sargentiana*).

И наконецъ, въ верхнемъ поясѣ альпійскихъ луговъ и прилежащихъ розсыпяхъ: лютикъ (*Ranunculus gelidus*), василекъ рогатый (*Delphinium densiflorum*), горькая трава (*Saussurea Medusa*), *Crematodium humile*, *Cr. discoideum*, пушникъ (*Crepis soroccephala*) и друг.

Что касается до млекопитающихъ и птицъ, замѣченныхъ нами въ районѣ изслѣдованныхъ экспедиціей горъ Бурханъ-Будда, то о нихъ было говорено на страницѣ 305. Теперешнія экскурсіи ничего особеннаго не прибавили. Случайно, на пастьбѣ былъ пойманъ тушканчикъ, не отмѣченный выше. Этого строгаго изящнаго звѣрька монголы

1) Этотъ видъ спускается въ область нижняго пояса.

2) Мытникъ Пржевальскаго проникаетъ въ верхній поясъ альпійскихъ луговъ.

3) *Saxifraga tangutica* распространяется до предѣла верхняго пояса.