

сравнительно разстояніи къ съверу отъ горъ, вдоль ихъ подошвы, тамъ и сямъ обнажаются: діоритъ<sup>1)</sup>, гранитъ<sup>2)</sup>, гнейсъ<sup>3)</sup> и уже отмѣченные выше бѣлый жильный кварцъ, песчаникъ<sup>4)</sup> и порфиритовые туфы<sup>5)</sup>.

По части растительности, въ смыслѣ которой и придано название „три хорошихъ“, Гурбанъ-сайханъ свойственны: дикій абрикосъ, хармыкъ, бударгана, два вида караганы, изъ травянистыхъ же формъ — чернобыльникъ, полынка, дэрэсунъ, ковыль (*Stipa orientalis*), различные злаки, пырей, *Calamagrostis* и нѣсколько видовъ солянокъ. По части же животнаго царства, изъ звѣрей: каменные бараны или аргали, горные козлы, волки, лисицы, хорьки, зайцы и болѣе мелкіе грызуны, а изъ птицъ: черные грифы, орлы, сокола, филины, совы, черные вороны, жаворонки, завиушки, вьюрки, горные голуби и каменные куропатки. Монгольское населеніе со своими стадами<sup>6)</sup> ютилось въ это время по обоимъ склонамъ горъ, преимущественно вблизи источниковъ и глубокихъ ущелій, богатыхъ льдомъ или снѣгомъ. Начальникъ хошуна—Балдынъ-цзасакъ проживалъ у южнаго подножья средняго или Дунду-сайханъа. Въ прилежащей съ юга долинѣ также не мало кочевало монголовъ, группировавшихся главнымъ образомъ около двухъ первостатейныхъ монастырей Байшинтэнъ-хитъ и Шюлюты; первый насчитываетъ въ своихъ стѣнахъ отъ ста до пятисотъ ламъ, въ зависимости отъ времени года и періодическихъ хураловъ; второй значительно меньше.

Оставивъ Шины-кобэръ двадцать второго октября, экспедиція въ три послѣдующихъ дня достигла уроцища Хонгыръ-обо. Въ первый изъ этихъ дней мы ночевали у съверной окраины Гурбанъ-сайханъ, второй у южной; пересѣченіе горъ было произведено по плоскому луговому перевалу Охинъ-кутэль, поднятому надъ моремъ на 7.270 футовъ. Къ югу и съверу съ массивовъ Гурбанъ-сайханъ сбѣгаютъ длинныя бэли—покатости, граничащія съ большими кукухото'скими дорогами и открываются широкіе виды, въ особенности къ съверу, гдѣ мѣстность послѣ котловинообразной долины снова заволновалась высотами и грядами, изъ которыхъ на нашемъ пути выдѣляются Онцо и Хонгыръ-обо;

1) Біотитовый съ эпидотомъ, жильный.

2) Двуслюдистый, свѣтло-розовый.

3) Біотитово-роговообманковый, зелено-сѣрый.

4) Слюдисто-глинистый, свѣтло-сѣрый, мелкозернистый.

5) Буро-зеленый, вывѣтрѣлый или плотный.

6) Въ ущельи южнаго склона Гурбунъ-сайханъ мы наблюдали сарлоковъ или домашнихъ яковъ.