

шой рѣчки, кажется До-чу, проводники намъ указывали какъ мѣсто стоянки какихъ то двухъ пилин'овъ которые тутъ прошли за нѣсколько лѣтъ до нашего прихода. По всему надо предполагать, что это были Bower и Thorold. Къ сожалѣнію маршрутъ и съемка Bower'a проложены на карту столь малаго масштаба, что невозможно точно опредѣлить точки пересѣченія нашихъ маршрутовъ. Весьма вѣроятно, однако, что эта точка соотвѣтствуетъ его „Camp № 118“. Когда караванъ нашъ ночевалъ въ указанномъ мѣстѣ, мы ночью сильно страдали отъ холода вслѣдствіи большой высоты и отсутствія топлива. На то же указываетъ и Bower' ¹⁾ давая и высоту (14325 футовъ).

Повернувъ къ западу, мы спустились вдоль теченія рѣчки До-чу, которая протекаетъ по довольно широкой долинѣ, склоны которой густо покрыты хвойнымъ лѣсомъ.

Падавшій уже второй день, снѣгъ покрылъ густой пеленой всю долину, маскируя собою многочисленныя наледи, образованныя ручьями на склонахъ. Лошади и быки на такихъ мѣстахъ скользили и падали и движеніе было затруднительно.

Вскорѣ мы спустились въ широкую долину Дза-чу; склоны ея также лѣсисты, но значительно меньшая высота ея даетъ возможность жителямъ сѣять хлѣбъ и всѣ ровныя площадки на склонахъ долины заняты пашнями. Рѣка замерзаетъ лишь мѣстами, а тамъ, гдѣ теченіе слабѣе и гдѣ долина шире и солнце дольше можетъ обогрѣвать поверхность, на рѣкѣ встрѣчаются въ большомъ числѣ полыньи. Общее направленіе рѣки на юго-юго-востокъ; по берегамъ ея разбросано много селеній и небольшихъ монастырей. Въ одномъ мѣстѣ долина сильно суживается и рѣка течетъ среди отвѣсныхъ скалъ, по узкимъ уступамъ которыхъ вьется тропинка; пласты породы ²⁾ мѣстами подняты вертикально, мѣстами же горизонтальные слои подверглись сильному сжатію и разрѣзы на правомъ берегу показываютъ изгибы замѣчательные по кривизнѣ и размѣрамъ.

Выше по теченію долина расширяется и начинаютъ встрѣчаться въ большомъ числѣ засѣянные поля и крупныя селенія (напримѣръ Вомда-гунъ (на картѣ Вамда-гунъ), на высотѣ 11.880 футовъ надъ уровнемъ моря), состоящія изъ многихъ построекъ тѣсно прижатыхъ одна къ другой и расположенныхъ по большей части на скатахъ хол-

¹⁾ Bower. 1 с.

²⁾ Обрывы состоятъ здѣсь изъ плотнаго темно-сѣраго известняка, въ которомъ проф. Обручевъ обнаружилъ присутствіе мелкихъ остатковъ организмовъ; мѣстами встрѣчаются выходы буро-сѣраго глинистаго сланца.