

№	Мѣстонахожденіе.	Определеніе.
4	Долина р. Буюнту.	Сланецъ хлоритово-кварцевый, сѣро-зеленый.
5		Бѣлый жильный кварцъ.
6	Не доставленъ.	Не доставленъ.

II.

Южный склонъ Монгольского Алтая.

№	Мѣстонахожденіе.	Определеніе.
7	Южный склонъ хребта Алтайн-нуру; преобладающая порода.	Гнейсъ мусковитовый свѣтлорозово-сѣрый м.з. съ пропластками сѣраго кварца.
8	Валуны въ равнинѣ на южномъ склонѣ Алтайн-нуру.	Гнейсъ біотитовый, св.-сѣрый и желтый м.з.
9	Въ огромныхъ массахъ вблизи уроч. Ама-булукъ. Толстые слои подняты вертикально съ простираніемъ съ W на O и SW на NO. Между ними прослойки слѣдующаго (№ 10) до трехъ аршинъ мощности.	Сланецъ слюдяно-кварцевый сѣрый, тонкослоистый (преобладаетъ біотитъ, мусковитъ слоями).
10	Тамъ же.	Кварцъ желтый (пластовый).
11	Выходъ изъ ущелья Кукубулукъ въ равнину. Массивные выходы въ одномъ только месте. Въ немъ прослойки кварца (№ 10).	Гнейсъ очковый, біотитово-рогово-обманковый, сѣро-зеленый м.з.
12	Образцы почвы подъ посевами ячменя на р. Бидженголь (южный склонъ Алтайн-нуру).	Песокъ слюдисто-глинистый, желто-сѣрый мелкій.
13	На перевалѣ Улан-булугин-даба, (западный склонъ, ниже вершины перевала.)	Кремнисто-кварцевая порода, брекчіевидная (съ прожилками кальцита и эпидота и вкрапленностями пироксена) буро-сѣрая.