

erythrogastra, *Ruticilla alaschanica*, *Ruticilla hodgsoni*, *Ruticilla rufiventris nipalensis*, *Ianthia cyanura* и *I. cyanura rufilata*, *Pratincola maura przewalskii*, *Cinclus cashmeriensis*, *Trochalopteron ellioti*, *Pomatorrhinus gravivox dedekensi*, *Leptopoeile sophiae obscura* и *L. henrici*, *Rhopophilus pekinensis albosuperciliaris*, *Poliomyias hodgsoni* и *P. luteola*, *Cotile riparia*, *Chelidon urbica* и *Ch. lagopoda*, *Ch. cashmeriensis*, *Bubo bubo sibiricus*, *Oenopopelia humilis*, *Chroicocephalus brunneiceps*, *Cirripidesmus mongolus pyrrhothorax*, *Limosa limosa*, *Tetraophasis obscurus* и *T. széchenyii*, *Tetraogallus tibetanus* и *T. tibetanus henrici*, азіатскихъ формъ рода *Caccabis*, формъ *Ithaginis sinensis*, видовъ рода *Crossoptilon* и *Phasianus decollatus strauchii*.

Синоптическія таблицы я считалъ нужнымъ привести: для видовъ рода *Pyrgilauda*, азіатскихъ формъ рода *Motacilla* (adlt.), формъ рода *Ianthia*, формъ рода *Pomatorrhinus* (группа безъ бѣлой брови), видовъ рода *Poliomyias*, рода *Chelidon*, родовъ *Eudromias*, *Aegialeus*, *Aegialites*, *Podosocys*, *Cirripidesmus*, *Squatorola* и *Charadrius*, азіатскихъ формъ родовъ *Scolopax*, *Gallinago*, *Limnocyptes* и *Rostratula*, центрально азіатскихъ формъ рода *Caccabis*, видовъ рода *Crossoptilon* и палеарктическихъ видовъ рода *Circus*.

Выше я резюмировалъ для облегченія читателя главнѣйшіе результаты обработки сбора въ систематическомъ отношеніи, къ фаунистическимъ и зоогеографическимъ я перейду послѣ болѣе подробнаго изложенія маршрута экспедиціи и краткаго физико-географическаго очерка пройденныхъ ею странъ, тутъ же ограничусь лишь перечнемъ формъ, область распространенія которыхъ я очертилъ болѣе или менѣе точно, именно: *Loxia himalayana*, *Sitta przewalskii*, *Lanius giganteus*, *Ianthia cyanura* и *I. cyanura rufilata*, *Cinclus przewalskii*, *Cinclus cashmeriensis*, *Pomatorrhinus gravivox P. gravivox dedekensi*, *Rhopophilus pekinensis* и *R. pekinensis albosuperciliaris*, *Chelidon urbica* и *Ch. lagopoda*, *Chelidon cashmeriensis*, *Gecinus guerini*, *G. guerini kogo*, *G. guerini tancolo*, *Picoides funebris*, *Bubo bubo sibiricus*, и *B. bubo tibetanus*, *Columba leuconota*, *Oenopopelia humilis*, *Cirripidesmus geoffroyi*, *Cirripidesmus mongolus pyrrhothorax*, *Tetrastes sewertzowi*, *Tetraophasis obscurus* и *T. széchenyii*, азіатскихъ формъ рода *Caccabis*, *Perdix sifanica*, видовъ рода *Crossoptilon*, *Phasianus decollatus strauchii*, *Gennaia altaica*¹⁾, *Gennaia milvipes milvipes*¹⁾ и *Falco barbarus babylonicus*¹⁾.

Всѣ числа приведены по старому стилю.

1) Область распространенія этихъ формъ очерчена проф. М. А. Меназиромъ.