Распредѣленіе собраннаго матеріала по пути экспедиціи.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Южный Алтай. Altai meridionalis.	Гобійскій Алтай. Altai gobiensis.	Центральная Гоби. Gobi centralis.	Вост. Монголія. Mongolia orientalis.	Вост. Нань-шань. Nan-schan orientalis.	Кукунорскій массивъ. Kuku-nor.	Восточный Цайдамъ. Zaidam orientalis.	Вост. окр. Тибета: Margo or. Tibetae:			
								Басс. Желтой р. Fl. Hoang-ho.	Басс. Голубой р. Fl. Yang-tze.	Басс. Меконга. Fl. Mekong.	
Передній путь.	Съ 11. VI по 29. VIII. 1889.	Съ 30. VIII по 7. XII. 1899.	Съ 8. XII. 1899 по 22. I. 1900.		Съ 23. I по 24. III. 1900.	Съ 25. III по 7. IV. 1900.	Съ 8. IV по 16. V. 1900.	Съ 17. V по 8. VII. 1900.	Съ 9. VII по 24. VIII. 1900.	Съ 25. VIII по 20. XI. 1900.	
Обратный путь.		20—26. X. 1901.	Съ 20. IX по 19. X. 1901.	Съ 27. X по 26. XI. 1901.	Съ 22. VIII по 19. IX. 1901.	8—21. VIII. 1901.	1—7. VIII. 1901.	Съ 22. V по 31. VII. 1901.	Съ 5. III по 21. V. 1901.	Съ 20. XI. 1900 по 4. III. 1901.	
Ordo Passeriformes.											
Fam. **Corvidae.**											
1. *Tripanocorax frugilegus* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
2. *Corvus corax* Linn.	—	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	7220′.
3. *Corone corone* (Linn.)	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2740—4100′.
4. — *macrorrhyncha levaillanti* (Less.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.430′.
5. *Coloeus dauricus dauricus* (Pall.)	—	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4770—4820′.
6. — *dauricus khamensis* Bianchi	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.990′.
7. *Graculus graculus* (Linn.)	+	+	. .	+	. .	. .	. .	. .	+	+	4350—15.140′.
8. *Nucifraga caryocatactes leptorhyncha* Brehm.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 4500′.
9. *Podoces hendersoni* Hume	. .	+	+	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	3710—5430′.
10. *Pseudopodoces humilis* (Hume)	. .	. .	. .	. .	+	. .	+	. .	+	+	4670—12.710′.
11. *Garrulus brandti* Eversm.	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	2530—7100′.
12. *Cyanopolius cyaneus* (Pall.)	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	7100—9500′.
13. *Pica pica leucoptera* Gould	+	+	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3180—c. 6000′.
14. — *bottanensis* Deless.	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	+	+	+	7100—c. 14.000′.
Fam. **Sturnidae.**											
15. *Sturnus poltaratzkii* Finsch	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3740—6500′.
16. *Spodiopsar cineraceus* (Temm.)	.	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	6070′.
Fam. **Oriolidae.**											
17. *Oriolus galbula* Linn.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.