	1 Южный Алтай. Altai merid.	2 Гобійскій Алтай. Altai gobiensis.	3 Центральная Гоби. Gobi central.	4 Вост. Монголія. Mongolia orient.	5 Вост. Нань-шань. Nan-schan orient.	6 Кукунорскій масс. Kuku-nor.	7 Вост. Цайдамъ. Zaidam orient.	Вост. окр. Тибета: Margo or. Tibetae: 8 Басс. Желтой р. Fl. Hoang-ho.	9 Басс. Голубой р. Fl. Yang-tze.	10 Басс. Меконга. Fl. Mekong.	
Fam. Fringillidae.											
18. *Calcarius lapponicus* (Linn.)	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 3000—7220′.
19. *Cynchramus schoeniclus* (Linn.)	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4400′.
20. — *pyrrhuloides* (Pall.)	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2740—3180′.
21. *Emberiza hortulana* Linn.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480—c. 7500′.
22. — *godlewskii* Tacz.	. .	. .	+	. .	+	+	. .	. .	+	+	4000—c. 13.000′.
23. — *cioides* Brdt.	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	c. 8000′.
24. — *aureola* Pall.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 4500′.
25. — *leucocephala* S. G. Gmel.	+	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	3480—c. 12.000′.
26. — *kozlowi* Bianchi.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.960—c. 15.000′.
27. *Urocynchramus pylzowi* Przew.	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	+	. .	c. 12.000—15.140′.
28. *Carpodacus erythrinus erythrinus* (Pall.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480—c. 6000′.
29. — *erythrinus grebnitzkii* Stejn.	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	—	+	7100—12.000′.
30. — *sewertzowi* Sharpe.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	+	. .	9380—c. 14.000′.
31. — *rubicilloides* Przew.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	11.000—15.000′.
32. — *trifasciatus* Verr.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.000—12.000′.
33. — *pulcherrimus* (Moore)	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	+	+	7100—13.040′.
34. — *dubius* Przew.	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	+	+	7100—13.040′.
35. *Bucanetes mongolicus* (Swinh.)	+	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 4000—c. 5500′.
36. *Pyrrhospiza longirostris* Przew.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	—	. .	c. 14.000′.
37. *Loxia himalayana* Hodgs.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	c. 11.000—13.040′.
38. *Cannabina brevirostris* (Gould).	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	c. 6000—15.160′.
39. *Kozlowia roborowskii* (Przew.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	13.860—16.020′.
40. *Leucosticte haematopygia* Gould	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	+	. .	+	9350—16.040′.
41. *Onychospiza taczanowskii* Przew.	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	+	+	c. 11.000—13.830′.
42. *Pyrgilauda davidiana* Verr.	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4490—c. 7000′.
43. — *ruficollis* (Blanf.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	+	10.660—16.040′.
44. *Montifringilla alpicola* (Pall.)	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4490—6860′.
45. — *adamsi* Moore	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	10.660—16.040′.
46. *Fringillauda nemoricola* Hodgs.	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	+	+	+	7100—16.040′.
47. *Passer domesticus domesticus* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
48. — *montanus montanus* (Linn.)	+	. .	+	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	3480—9380′.
49. — *ammodendri ammodendri* Sewertzow.	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3180′.
50. — *ammodendri stoliczkae* Hume.	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 4500′.
51. *Petronia petronia petronia* (Linn.)	. .	+	. .	. .	+	. .	. .	+	+	. .	c. 5000—16.040′.
52. *Chloris sinica* (Linn.)	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	c. 8000′.
53. *Mycerobas carneipes* (Hodgs.)	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	+	+	7100—13.040′.
54. *Pyrrhula erithacus* Blyth.	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	7100′.
Fam. Alaudidae.											
55. *Otocorys brandti brandti* Dresser.	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3710—7220′.
56. — *brandti montana* Bianchi.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 6000—c. 8000′.
57. — *brandti przewalskii* Bianchi.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	c. 9000′.
58. — *elwesi elwesi* Blanf.	. .	. .	(+)	. .	+	. .	+	. .	. .	. .	4400—c. 9000′.
59. — *elwesi khamensis* Bianchi.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	+	13.000—14.000′.
60. *Calandrella brachydactyla brachydactyla* (Leisl.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 6000′.