	Южный Алтай. Altai merid.	Гобійскій Алтай. Altai gobiensis.	Центральная Гоби. Gobi central.	Вост. Монголія. Mongolia orient.	Вост. Нань-шань. Nan-schan orient.	Кукунорскій масс. Kuku-nor.	Вост. Цайдамъ. Zaidam orient.	Вост. окр. Тибета: Margo or. Tibetae: Басс. Желтой р. Fl. Hoang-ho.	Басс. Голубой р. Fl. Yang-tze.	Басс. Меконга. Fl. Mekong.	
	1	2	3	4	6	7	7	8	9	10	
95. *Periparus beavani* (Jerd.)	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	+	+	7100—13.040′.
96. *Parus major* Linn.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	3480′.
97. — *minor* Temm. et Schl.	. .	. .	+	. .	+	. .	. .	. .	+	+	4400—12.020′.
98. *Cyanistes cyanus tianschanicus* Sewertz.	—	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3180′.
99. *Acredula caudata macrura* Seeb.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
Fam. Panuridae.											
100. *Panurus biarmicus sibiricus* Bonap.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	c. 9000′.
Fam. Laniidae.											
101. *Lanius sphenocercus* Cab.	. .	. .	+	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	c. 5000—6070′.
102. — *giganteus* Przew.	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	+	+	+	c. 9000—12.630′.
103. *Caudolanius tephronotus* (Vig.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	11.660—c. 14.000′.
104. *Otomela isabellina* (Hempr. et Ehrb.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	9000—10.910′.
105. — *phoenicura* (Pall.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 5500′.
106. — *phoenicuroides karelini* (Bogd.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 5500′.
107. *Enneoctonus collurio* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
Fam. Sylviidae.											
108. *Sylvia sylvia* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
109. — *currura* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
110. — *minuscula* Hume.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	9380′.
111. — *nana* (Hempr. et Ehrb.)	+?	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 6000′.
112. *Acanthopneuste plumbeitarsa* (Swinh.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	14.000′.
113. — *viridana* (Blyth)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
114. — *lugubris* (Blyth)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	c. 13.000′.
115. *Reguloides proregulus newtoni* Gätke.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	12.000—13.040′.
116. *Oreopneuste fuscata* (Blyth)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	+	7000—c. 14.000′.
117. — *affinis* (Tickell)	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	+	+	. .	10.660—c. 14.000′.
Fam. Turdidae.											
118. *Turdus viscivorus hodgsoni* Homeyer.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
119. — *pilaris* Linn.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
120. — *atrigularis* Temm.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480—c. 6500′.
121. — *ruficollis* Pall.	. .	+	. .	. .	+	+	. .	. .	. .	+	4400—11.430′.
122. *Merula kessleri* Przew	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	+	c. 11.000—13.040′.
123. *Monticola saxatilis* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	7000—9380′.
124. *Chimarrhornis leucocephalus* (Vig.)	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	+	+	8000—14.000′.
125. *Ruticilla frontalis* (Vig.)	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	+	. .	10.000—13.200′.
126. — *schisticeps* (Hodgs.)	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	+	+	7100—13.040′.
127. — *erythrogastra* (Güld.)	. .	+	. .	. .	+	. .	. .	+	+	+	3180—c. 14.000′.
128. — *alaschanica* Przew.	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	+	. .	. .	6610—c. 12.000′.
129. — *erythronota* (Eversm.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.