	1 Южный Алтай. Altai merid.	2 Гобійскій Алтай. Altai gobiensis.	3 Центральная Гоби. Gobi central.	4 Вост. Монголія. Mongolia orient.	5 Вост. Нань-шань. Nan-schan orient.	6 Кукунорскій масс. Kuku-nor.	7 Вост. Цайдамъ Zaidam orient.	8 Вост. окр. Тибета: Margo or. Tibetae: Басс. Желтой р. Fl. Hoang-ho.	9 Басс. Голубой р. Fl. Yang-tze.	10 Басс. Меконга. Fl. Mekong.	
Ordo Columbiformes.											
Fam. **Columbidae.**											
187. *Columba rupestris* Pall.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 6000′.
188. — *leuconota* Vig.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.960′.
Fam. **Peristeridae.**											
189. *Turtur ferrago* (Eversm.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3840′.
190. *Streplopelia douraca stoliczkae* (Hume).	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4400′.
191. *Oenopopelia humilis* (Temm.)	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 5000′.
Fam. **Pteroclidae.**											
192. *Syrrhaptes paradoxus* (Pall.)	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4000—6000′.
193. — *tibetanus* Gould.	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	c. 11.000′.
Ordo Lariformes.											
Fam. **Laridae.**											
194. *Sterna fluviatilis fluviatilis* Naum.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4490—7000′.
195. — *fluviatilis tibetana* Saund.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	13.000′.
196. *Chroicocephalus ridibundus* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3700′.
197. — *brunneicephalus* (Jerd.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	+	. .	13.370—14.580′.
198. *Larus cachinnans* Pall.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	6000—7000′.
Ordo Charadriiformes.											
Fam. Charadriidae.											
199. *Vanellus vanellus* (Linn.)	+	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4500—5500′.
200. *Squatarola helvetica* (Linn.)	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3710′.
201. *Charadrius dominicus fulvus* Gmel.	. .	+	+	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	3180—9000′.
202. *Eudromias morinellus* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	7000′.
203. *Cirrepidesmus geoffroyi* (Wagl.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5500′.
204. — *mongolus pyrrhothorax* (Gould).	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	13.370—13.890′.
205. — *alexandrinus* (Linn.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	9000—9630′.
206. *Ibidorhynchus struthersi* Vig.	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	4820—9120′.
207. *Numenius arquatus lineatus* Cuv.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3740′.
208. *Limosa limosa* Linn.	+	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	6000—11.000′.
209. *Glottis nebularius* (Gunn.)	. .	—	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	6540′.
210. *Totanus calidris* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	+	. .	5500—13.000′.
211. *Helodromas ochropus* (Linn.)	+	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	+	. .	4820—12.500′.
212. *Tringoides hypoleucus* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	3480—10.910′.
213. *Terekia cinerea* (Güld.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	7000′.
214. *Pavoncella pugnax* (Linn.)	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	6540′.
215. *Limonites temmincki* (Leisl.)	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	5000—13.000′.