	1 Южный Алтай. Altai merid.	2 Гобійскій Алтай. Altai gobiensis.	3 Центральная Гоби. Gobi central.	4 Вост. Монголія. Mongolia orient.	5 Вост. Нань-шань. Nan-schan orient.	6 Кукуноpскій масс. Kuku-nor.	7 Вост. Цайдамъ. Zaidam orient.	Вост. окр. Тибета: Margo or. Tibetae: 8 Басс. Желтой р. Fl. Hoang-ho.	9 Басс. Голубой р. Fl. Yang-tze.	10 Басс. Меконга. Fl. Mekong.	
243. *Gennaia milvipes milvipes* Menzb. ex Hodgs.	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	+	+	+	·····—15.000′.
244. *Falco barbarus babylonicus* Gurney.	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4770′.
245. *Hypotriorchis subbuteo* (Linn.). . .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480—4500′.
246. *Aesalon aesalon* Tunst.	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	c. 7000′.
247. *Erythropus vespertinus* (Linn.). . .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
248. *Tinnunculus tinnunculus tinnunculus* (Linn.).	+	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480—4820′.
Fam. Aquilidae.											
249. *Milvus melanotis* Temm. & Schl. .	+	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	4500—12.000′.
250. *Haliaëtus leucoryphus* (Pall.) . . .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5500—6000′.
251. *Aquila chrysaëtus daphanea* Sewertz. ex Hodgs.	. .	. .	+	. .	+	. .	. .	. .	+	. .	4820—13.000′.
252. — *nepalensis* Hodgs.	. .	+	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	+	6000—13.340′.
253. *Archibuteo hemiptilopus* Blyth. . .	+	. .	. .	. .	+	. .	. .	+	+	+	7000—15.000′.
254. *Buteo leucocephalus* Hodgs. . . .	. .	. .	. .	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	5000—8000′.
255. — *plumipes* Hodgs.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.000—12.320′.
256. — *leucurus* Naum.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	9000′.
257. — *desertorum* (Daud.).	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4500′.
258. *Astur palumbarius khamensis* Bianchi.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.960′.
259. *Accipiter nisus ladygini* Bianchi. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	11.000—13.040′.
260. *Circus cineraceus* (Mont.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3480′.
261. — *macrurus* (S. G. Gmel.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4000—5500′.
262. — *cyaneus* (Linn.).	+	+	. .	. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	4000—9630′.
263. — *spilonotus* Kaup.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3740′.
264. — *aeruginosus* (Linn.).	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5500′.
Fam. Vulturidae.											
265. *Gypaëtus barbatus* (Linn.).	. .	—	. .	. .	+	. .	. .	. .	—	—	7100′.
266. *Gyps himalayensis* Hume	. .	. .	. .	. .	—	. .	. .	+	—	—	14.000′.
Ordo Anseriformes.											
Fam. Anatidae.											
267. *Cygnus cygnus* (Linn.).	+	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5500—7220′.
268. *Anser anser* (Linn.).	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5500′.
269. *Melanonyx segetum segetum* Gmel. .	. .	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	4500′.
270. — *arvensis sibiricus* (Alpher.) . .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	6000′.
271. *Eulabeia indica* (Lath.).	+	. .	. .	. .	—	. .	. .	. .	—	. .	5000′.
272. *Cygnopsis cygnoides* (Linn.)	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3740′.
273. *Casarca casarca* (Linn.).	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8000′.
274. *Anas boscas* Linn.	—	. .	. .	. .	. .	. .	—	. .	. .	. .	—
275. *Mareca penelope* (Linn.).	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	6500′.
276. *Nettion crecca* (Linn.).	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3740—4500′.
277. *Dafila acuta* (Linn.).	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	7000′.