

	Южный Алтай. Altai merid.		Гобийский Алтай. Altai gobiensis.		Центральная Гоби. Gobi central.		Вост. Монголия. Mongolia orient.		Вост. Нань-шань. Nan-schan orient.		Кукунорский масс. Kuku-nor.		Вост. Цайдамъ. Zaidam orient.		Вост. окр. Тибета: Margo or. Tibetae:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
278. <i>Spatula clypeata</i> (LINN.)	+	+														3180'.
279. <i>Aythya ferina</i> (LINN.)			+													9000'.
280. <i>Fuligula fuligula</i> (LINN.)																9630—11.010'.
281. <i>Merganser serrator</i> (LINN.)	+															4490'.
Ordo Pelargiformes.																
Fam. Ardeidae.																
282. <i>Ardea cinerea</i> LINN.	+	+														3740—8700'.
283. <i>Herodias alba alba</i> LINN.			+													3740—4820'.
Ordo Pelecaniformes.																
Fam. Pelecanidae.																
284. <i>Pelecanus crispus</i> BRUCH.	+															3740'.
Ordo Columbiformes.																
Fam. Podicipedidae.																
285. <i>Lophoethyia cristata</i> (LINN.)	+															13.370'.
286. <i>Dytes cornutus</i> (GMEL.)	+															4000'.
Fam. Columbidae.																
287. <i>Colymbus arcticus</i> LINN.	+															5000—7000'.
Итого	110	46	33	7	67	30	25	41	83	86						
				72				123						115		
															129	

Прежде, чѣмъ перейти къ возможнымъ фаунистическимъ и зоогеографическимъ выводамъ на основаніи только-что приведенного материала, считаю безусловно необходимымъ дать, частью со словъ П. К. Козлова и Н. М. Пржевальского, сжатый очеркъ физико-географического характера пройденныхъ экспедицій странъ.

Горная система Алтая, протянувшаяся въ NW—SO направлениі отъ истоковъ Оби до западнаго угла великой излучины Желтой рѣки, распадается на двѣ рѣзко отличающіяся другъ отъ друга части, которые дѣлятся