

изрѣдка видѣются увалы сыпучаго песку. Растительность представлена только кустарниковыми формами и не разнообразна: по песчанымъ холмамъ саксауль, по ручьямъ рѣчекъ — тамарискъ, карагана и немногіе другіе кустарники; травянистой растительности — дэрэсуна и камыша — вовсе не было видно. Колодцы плохи и по количеству и по качеству воды; путешественники довольствовались большею частью снѣгомъ, которымъ была занесена въ это время вся эта область. Животной жизни не было вовсе замѣтно, если не считать нѣсколькихъ *Gazella subgutturosa*; но и его путники не встрѣчали передъ тѣмъ въ теченіе цѣлой недѣли. — Съ приходомъ въ долину Гойцзо путешественники были наконецъ порадованы травянистой растительностью — камышемъ, скрывавшимся въ замкнутыхъ бурханами котловинкахъ — и представителями пернатого царства (*Podoces hendersoni*, *Calcarius lapponicus*, *Emberiza godlewskii*, *Pseudalaudula seebohmi*, *Corone corone* и пролетныя стайки *Syrrhaptes paradoxus*, которыхъ угоняло на юго-востокъ вѣроятно обиліе снѣга), тогда какъ въ передъ тѣмъ пройденной мѣстности встрѣчали часто лишь погибшихъ птицъ. Отъ южной окраины котловины, колодца Дэнгинъ-худукъ (18—20. XII), расположеннаго на самой границѣ песковъ, мѣстность опять начинаетъ постепенно повышаться, почву представляютъ сыпучіе пески, лежащіе однако не сплошною массою, а бѣльшими или меньшими участками бархановъ версть въ 40—50, между которыми не мало оголенныхъ площадей, изъ коихъ болѣе высокія покрыты гравіемъ, а болѣе низменныя солончаками, мѣстами поросшими камышемъ и другими свойственными пустынь растеніями; у подошвы бархановъ произрастаютъ пышные кустарники и полукустарники, не рѣдко попадаетея даже травянистая растительность, гдѣ непременно держатся и номады съ ихъ стадами; верстахъ въ 20 къ сѣверу отъ озера Куку-бурду (4840') тянется съ запада на востокъ почти сплошная полоса саксаульнаго лѣса версть въ 10—20 шириною. Верстахъ въ 40 къ югу отъ этого озера (28—29. XII) простирается съ NO на SW хребетъ Ябарай (1. I. 1900) съ пологимъ сѣвернымъ и крутымъ, обрывающимся стѣной южнымъ склонами и переваломъ Обото въ 5740 футовъ. Въ узкихъ ущельяхъ южнаго склона попадаются ключевые источники, окаймленные небогатою древесною, кустарною и травянистой растительностью, но въ общемъ по всему видно, что атмосферныхъ осадковъ приносится сюда весьма немного: зной и крайняя сухость сосѣдней пустыни безслѣдно уничтожаютъ облака, случайно пригнанные отъ обильнаго влагой восточнаго Нань-шаня. — Отсюда къ югу физико-географическія условія начинаютъ постепенно улучшаться. Отъ хребта Ябарай до Лянъ-чжоу мѣстность слабо пересѣченная и оживляется въ серединѣ рѣкою Шуй-хо (7—8. I), берущею начало въ Нань-шанѣ и