

господствуютъ юго-восточные вѣтры, а чаще постоянное затишье и дожди съ грозами; часты также жары по крайней мѣрѣ въ іюлѣ, впрочемъ ночи прохладны. Въ зависимости отъ рѣзкаго различія климата разительное несходство получается и въ растительности, и фаунѣ. Восточный Нань-шань, въ особенности на сѣверныхъ склонахъ своихъ хребтовъ, покрытъ густыми лѣсами изъ разнообразныхъ деревьевъ и кустарниковъ; альпійская его область изобилуетъ рододендронами и превосходными лугами; орнитологическая его фауна чрезвычайно богата. Въ западномъ Нань-шанѣ нѣтъ ни одного дерева, въ немъ наберется лишь съ десятокъ видовъ большою частью уродливыхъ кустарниковъ, а среди травъ мало разнообразія даже въ альпійскомъ поясѣ.

Среднею, преимущественно степною своею частью Нань-шань переходитъ въ Кукунорскій массивъ, который представляетъ въ цѣломъ приподнятую почти на 11.000 футовъ нагорную степь, но «контрастъ климата, флоры и фауны этихъ степей съ сосѣдними горами Гань-су», т. е. съ восточнымъ Нань-шанемъ, говоритъ Пржевальскій, «удивительный. Постоянные дожди, снѣга и чрезвычайная сырость, преслѣдовавшія насъ во все время пребыванія въ горахъ, замѣнились теперь прекрасною осеннею погодою, стоявшею изо дня въ день. Но въ то же время, вмѣсто альпійскихъ луговъ, лѣсовъ и влажной черноземной почвы, передъ нами раскинулись глинисто-соленыя равнины, покрытыя превосходною степною травою и высокимъ дырисуномъ. Явились также всегдашніе обитатели монгольской степи: дзерены и пищухи, вмѣстѣ съ жаворонками и пустынниками. Какъ среди птицъ, такъ и среди млекопитающихъ, мы встрѣтили въ степяхъ Куку-нора новые, незнакомые еще виды, свойственные уже тибетскимъ пустынямъ», нераздѣльную часть которыхъ Кукунорскій массивъ въ сущности и представляетъ. Озеро Куку-норъ замерзаетъ на  $4\frac{1}{2}$  мѣсяца (съ половины XI до конца III). Весною погода сухая, ясная, ночью стоятъ довольно сильные морозы, но утромъ температура быстро повышается въ тихую погоду; вѣтеръ дуетъ въ двухъ главныхъ направленіяхъ — восточномъ (слабый) и западномъ (иногда достигаетъ силы бури); контрастъ съ климатомъ юго-восточнаго Нань-шаня въ апрѣлѣ такой же рѣзкій какъ и осенью: «... физиономія горъ Гань-су, въ началѣ апрѣля, ничуть не измѣнилась противъ того, какою нашли мы ее прошедшею осенью въ половинѣ октября». Къ югу отъ озера и впадающей въ него съ запада самой большою изъ рѣкъ, Бухайнъ-голь, по плато тянется отъ NW къ SO Южно-Кукунорскій хребетъ, который «можетъ считаться діагональною связью горъ Нань-шаня съ Кунь-лунемъ». Мѣстами хребетъ «широко расплывается, дробясь на нѣсколько цѣпей, раздѣленныхъ долинами. Сѣверный склонъ горъ уже, южный наобо-