

чень **) имѣеть болѣе широкое распространеніе по центральному и южному Китаю. И такъ, 18 формъ мы можемъ признать за эндемическій элементъ, свойственный исключительно мупино-камской подобласти, одной изъ трехъ (другія двѣ: центрально-китайская и западно-гималайская), на которыя распадается повидимому китайско-гималайская область. — Слѣдующія 22 формы, будучи общими для мупино-камской подобласти и для сѣверо-восточной окраины Тибета, не распространяются однако никуда болѣе, если не считать небольшого захожденія трехъ изъ нихъ (отмѣчены ↑) въ сосѣдній съ Нань-шанемъ Ала-шань:

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Urocynchramus pylzowi</i> , | 12. <i>Merula kessleri</i> , |
| 2. <i>Carpodacus rubicilloides</i> , | 13. <i>Calliope tschebajewi</i> , |
| 3. ↑ <i>Carpodacus dubius</i> , | 14. <i>Accentor collaris tibetanus</i> , |
| 4. <i>Pyrrhospiza longirostris</i> , | 15. <i>Cinclus przewalskii</i> , |
| 5. * <i>Onychospiza taczanowskii</i> , | 16. <i>Trochalopteron ellioti</i> , |
| 6. * <i>Pyrgilauda ruficollis</i> , | 17. <i>Lophobasileus elegans</i> , |
| 7. * <i>Melanocoryphoides maxima</i> , | 18. ? <i>Bubo bubo tibetanus</i> , |
| 8. ↑ <i>Poecile affinis</i> , | 19. * <i>Grus nigricollis</i> , |
| 9. <i>Poeciloides superciliosa</i> , | 20. <i>Tetrastes sewertzowi</i> , |
| 10. <i>Lophophanes dichroides</i> , | 21. <i>Perdix sifanica</i> , |
| 11. <i>Lanius giganteus</i> , | 22. ↑ <i>Gennaia milvipes milvipes</i> . |

Изъ нихъ, отмѣченныхъ * нужно считать характерными для Тибетскаго нагорья собственно; къ этимъ четыремъ примыкають пять формъ, распространенныхъ по всему Тибету, но не заходящихъ въ Гималаи; онѣ слѣдующія:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. <i>Pseudopodoces humilis</i> , | 3. <i>Sterna fluviatilis tibetana</i> , |
| 2. <i>Calandrella tibetana</i> , | 4. <i>Chroicocephalus brunneiceps</i> , |
| | 5. <i>Tetraogallus tibetanus przewalskii</i> . |

Далѣе идетъ рядъ формъ, распространяющихся болѣе или менѣе въ верхніе пояса южнаго склона Гималаевъ; изъ нихъ двѣ однако не идутъ далѣе на западъ какъ до Сиккима, именно:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Pica bottanensis</i> , | 2. <i>Acanthopneuste lugubris</i> ; |
|------------------------------|-------------------------------------|

пять не далѣе Непала —

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. <i>Fringillauda nemoricola</i> , | 3. <i>Ruticilla schisticeps</i> , |
| 2. <i>Periparus beavani</i> , | 4. <i>Ruticilla hodgsoni</i> , |
| | 5. <i>Ruticilla rufiventris nipalensis</i> ; |

Остальныя 17 формъ доходятъ до сѣверо-западныхъ предѣловъ Гималая, частью же распространены и еще далѣе, до Гиндукуша, какъ напр.