

Ruticilla frontalis и др., или даже до Заалайскаго хребта, напр. *Columba leuconota*; онѣ слѣдующія:

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Loxia himalayana</i> , | 9. <i>Chimarrhornis leucocephala</i> , |
| 2. <i>Leucosticte haematopygia</i> , | 10. <i>Ruticilla frontalis</i> , |
| 3. <i>Montifringilla adamsi</i> , | 11. <i>Ianthia cyanura rufilata</i> , |
| 4. <i>Anthus rosaceus</i> , | 12. <i>Spermolegus strophiatius</i> , |
| 5. <i>Motacilla hodgsoni</i> , | 13. <i>Prunella rubeculoides</i> , |
| 6. <i>Troglodytes neglectus</i> , | 14. <i>Cinclus cashmeriensis</i> , |
| 7. <i>Reguloides proregulus newtoni</i> , | 15. <i>Chelidon cashmeriensis</i> , |
| 8. <i>Oreopneuste affinis</i> , | 16. <i>Columba leuconota</i> , |
| | 17. <i>Gyps himalayensis</i> . |

Всѣ перечисленные до сихъ поръ птицы не распространяются въ восточный Китай, но слѣдующіе два вида относятся къ нормальнымъ обитателямъ послѣдняго:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Carpodacus pulcherrimus</i> , | 2. <i>Caudolanius tephronotus</i> ; |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

изъ нихъ первый свойственъ лишь восточной Азіи и доходитъ до юго-восточной Монголіи, а второй распространяется въ восточномъ направленіи до Шанхая, а въ западномъ по южному Тибету и Гималаямъ до Сетлэджа.

Пока мы имѣемъ такимъ образомъ сумму въ 74 формы, свойственныхъ исключительно Тибету, Гималаю и Китаю; остальная 41 форма распространена болѣе широко; изъ нихъ 27 видовъ представляютъ элементъ субтропическаго царства, 14 же населяютъ въ то же время и царство бореарктическое¹⁾. Изъ первыхъ не заходятъ или едва заходятъ въ средиземноморскую область и ограничены только нагорно-азиатской слѣдующія 13 формъ:

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Emberiza godlewskii</i> , | 7. <i>Parus minor</i> , |
| 2. <i>Calandrella brachydactyla dukhunensis</i> , | 8. <i>Pratincola maura przewalskii</i> , |
| 3. <i>Alauda japonica inopinata</i> , | 9. <i>Lillia daurica</i> , |
| 4. <i>Agrodroma striolata</i> , | 10. <i>Cypselus pacificus</i> , |
| 5. <i>Motacilla alba baicalensis</i> , | 11. <i>Aquila chrysaëtus daphanea</i> , |
| 6. <i>Motacilla leucopsis</i> , | 12. <i>Archibuteo hemiptilopus</i> , |
| | 13. <i>Buteo plumipes</i> ; |

слѣдующія 9 должны считаться нормальными обитателями восточной части средиземноморской области, но не проникаютъ въ нее далѣе арало-каспійской котловины и Кавказа:

1) Бианки, Естествознание и Географія, 1905, № 7.