

1. *Carpodacus sewertzowi,*
2. *Cannabina brevirostris,*
3. *Mycerobas carneipes,*
4. *Budytes citreoloides,*
5. *Ruticilla erythrogaster,*
6. *Spermolegus fulvescens,*
7. *Athene bactriana,*
8. *Aquila nepalensis,*
9. *Eulabeia indica;*

наконецъ, остальные 5 распространены до альпийскихъ странъ западной Европы:

1. *Graculus graculus,*
2. *Petronia petronia petronia,*
3. *Tichodroma muraria,*
4. *Biblis rupestris,*
5. *Gypaetus barbatus.*

Изъ 14 бореарктическихъ формъ восточно-сибирской области свойственны четыре:

1. *Carpodacus erythrinus grebnitzkii,*
2. *Oreopneuste fuscata,*
3. *Turdus ruficollis,*
4. *Gallinago solitaria;*

наконецъ 10 видовъ имѣютъ очень широкое распространение кромѣ того и по всей или большей части европейско-сибирской области, именно:

1. *Budytes citreola,*
2. *Cyanecula caerulecula,*
3. *Cotile riparia,*
4. *Picus martius,*
5. *Jynx torquilla,*
6. *Cuculus canorus,*
7. *Totanus calidris,*
8. *Helodromas ochropus,*
9. *Limonites temmincki,*
10. *Fuligula fuligula.*

О свойствѣ пребыванія значительной части видовъ я не рѣшаюсь судить, всѣ же положительные данныя въ этомъ отношеніи видны изъ систематической части работы.

Перехожу къ анализу материала, добытаго въ остальной части маршрута экспедиціи, относящейся почти всецѣло къ нагорно-азіатской области. До полной обработки всѣхъ сосредоточенныхъ въ Музѣѣ Академіи Наукъ материаловъ изъ этой области и приведенія результатовъ этой обработки въ связь съ наличными литературными данными я не рѣшаюсь установить окончательно дѣленіе области на подобласти, но насколько могу судить по общему впечатлѣнію, вынесенному мною пока изъ знакомства съ нею, она распадается на пять подобластей: 1) Алтайско-саянскую, охватывающую южные цѣпи восточныхъ Саяновъ, часть южного Алтая, прилежащую къ последнему часть сѣверо-западной Монголіи и Джунгарію; 2) Гобійско-монгольскую, протянувшуюся отъ восточного подножія Памировъ черезъ бассейнъ Тарима, центральную Гоби съ Алашанемъ и Ордосомъ до истоковъ