

Амура и хребта Хинь-гань; 3) Манчжуро-китайскую — обнимающую собою Южно-Уссурійскій край, Корею, Манчжурію и сѣверо-восточный Китай къ югу до водораздѣла между бассейнами Желтой и Голубой рѣкъ; 4) Японскую, занимающую Японскій архипелагъ за исключеніемъ о-ва Іессо и 5) Тибетскую, охватывающую Цайдамъ, Нань-шань, Кукунорскій массивъ и большую часть Тибетскаго нагорья въ узкомъ смыслѣ слова за выключеніемъ Кама или юго-восточной его части въ верховьяхъ рѣкъ Голубой, Меконга, Салуэна и Брампутры. Маршрутъ экспедиціи прошелъ только по первой, второй и пятой изъ этихъ подобластей.

Въ Тибетской подобласти, задѣтой маршрутомъ экспедиціи въ ея крайнемъ восточномъ углу, собрано всего 123 формы. Изъ нихъ прежде всего эндемичны въ сѣверо-восточной части подобласти слѣдующія девять формъ:

- |  |   |
|--|---|
| 1. <i>Kozlowia roborowskii</i> (B., A.),     | 5. <i>Tetraogallus kozlowi</i> ,            |
| 2. <i>Otocorys brandti przewalskii</i> (Z.), | 6. <i>Caccabis magna</i> ,                  |
| 3. <i>Certhia familiaris bianchii</i> (N.),  | 7. <i>Ithaginis sinensis sinensis</i> (N.), |
| 4. <i>Ruticilla alaschanica</i> ,            | 8. <i>Crossoptilon auritum</i> ,            |
|  | 9. <i>Phasianus vlangalii</i> (Z.).         |

*Kozl. roborowskii* пока извѣстна только изъ хребтовъ Бурханъ-Будда и Амнэнъ-коръ, *Certh. bianchii* и *Ith. sinensis sinensis* лишь изъ Нань-шаня, *Otocorys brandti przewalskii* и *Phasianus vlangalii* только изъ Цайдама; *Ruticilla alaschanica* едва заходитъ въ сосѣдній Ала-шань, *Crossoptilon auritum* въ Ала-шань и сосѣднія части мушино-камской подобласти; *Tetraogallus kozlowi* распространенъ къ западу до Алтынъ-тага.

Слѣдующія 11 формъ свойственны исключительно или почти исключительно Тибетской провинціи; изъ нихъ пять (отмѣчены \*) ограничены восточной ея частью, остальные же распространены по всему Тибету:

- |  |   |
|--|---|
| 1. <i>Pseudopodoces humilis</i> ,      | 6. <i>Calandrella tibetana</i> ,                  |
| 2. * <i>Pica bottanensis</i> ,         | 7. * <i>Melanocoryphoides maxima</i> ,            |
| 3. * <i>Onychospiza taczanowskii</i> , | 8. <i>Syrrhaptes tibetanus</i> ,                  |
| 4. * <i>Pyrgilauda ruficollis</i> ,    | 9. <i>Chroicocephalus brunneiceps</i> ,           |
| 5. <i>Otocorys elwesi elwesi</i> ,     | 10. <i>Cirripidesmus mongolus pyrrhothorax</i> ,  |
|  | 11. * <i>Tetraogallus tibetanus przewalskii</i> . |

Далѣе слѣдуютъ 16 формъ, весьма характерныхъ для восточной окраины Тибета, проникающихъ въ мушино-камскую подобласть, но не распространяющихся ни въ верхніе пояса Гималаевъ, ни въ восточный Китай:

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. <i>Urocynchramus pylzowi</i> , | 3. <i>Pyrrhospiza longirostris</i> ,  |
| 2. <i>Carpodacus dubius</i> ,     | 4. <i>Otocorys elwesi khamensis</i> , |