

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 5. <i>Poecile affinis</i> ,          | 11. <i>Accentor collaris tibetanus</i> .   |
| 6. <i>Poeciloides superciliosa</i> , | 12. <i>Trochalopteron ellioti</i> ,        |
| 7. <i>Lophophanes dichroides</i> ,   | 13. <i>Lophobasileus elegans</i> ,         |
| 8. <i>Lanius giganteus</i> ,         | 14. <i>Tetrastes sewertzowi</i> ,          |
| 9. <i>Merula kessleri</i> ,          | 15. <i>Phasianus decollatus strauchi</i> , |
| 10. <i>Calliope tschebajewi</i> ,    | 16. <i>Gennaia milvipes milvipes</i> .     |

Въ Гималаи распространяется, но лишь до Сиккима

1. *Pyrrhula erythacus*;

до Непала доходятъ:

- |                                     |                               |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <i>Fringillauda nemoricola</i> , | 2. <i>Periparus beawani</i> , | 3. <i>Ruticilla schisticeps</i> ; |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

до западной оконечности, частью же до Афганистана и зап. Тянь-шаня:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. <i>Leucosticte haematopygia</i> ,   | 5. <i>Ruticilla frontalis</i> ,      |
| 2. <i>Montifringilla adamsi</i> ,      | 6. <i>Spermolegus strophiatius</i> , |
| 3. <i>Oreopneuste affinis</i> ,        | 7. <i>Prunella rubeculoides</i> ,    |
| 4. <i>Chimarrhornis leucocephala</i> , | 8. <i>Cinclus cashmeriensis</i> ,    |
|  | 9. <i>Gyps himalayensis</i> .        |

До юго-восточной Монголіи или восточнаго Китая доходятъ:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. <i>Carpodacus pulcherrimus</i> , | 3. <i>Sitta villosa</i> ,                 |
| 2. <i>Chloris sinica</i> ,          | 4. <i>Pterorrhinus davidi</i> ,           |
|                                     | 5. <i>Dendrocopus cabanisi cabanisi</i> . |

Въ общей сложности мы имѣемъ пока 54 формы; остальные 69 формъ распространены болѣе широко; изъ нихъ 40 субтропическихъ и 29 бореарктическихъ. Среди первыхъ не выходятъ или почти не выходятъ изъ предѣловъ нагорно-азиатской области слѣдующія 21 форма:

- |   |   |
|---|---|
| 1. <i>Podoces hendersoni</i> ,                | 12. <i>Lanius sphenocercus</i> ,                      |
| 2. <i>Cyanopolius cyaneus</i> ,               | 13. <i>Sylvia minuscula</i> ,                         |
| 3. <i>Spodiopsar cinerascens</i> ,            | 14. <i>Saxicola montana</i> ,                         |
| 4. <i>Emberiza godlewskii</i> ,               | 15. <i>Pratincola maura przewalskii</i> ,             |
| 5. <i>Emberiza cioides</i> ,                  | 16. <i>Leptopocile sophiae sophiae</i> ,              |
| 6. <i>Pseudalaudula pispoletta seebohmi</i> , | 17. <i>Rhopophilus pekinensis albosuperciliaris</i> , |
| 7. <i>Pterocorys mongolica</i> ,              | 18. <i>Gennaia altaica</i> .                          |
| 8. <i>Agrodroma richardi</i> ,                | 19. <i>Aquila chrysaetos daphanea</i> ,               |
| 9. <i>Motacilla alba baicalensis</i> ,        | 20. <i>Archibuteo hemiptilopus</i> ,                  |
| 10. <i>Motacilla leucopsis</i> ,              | 21. <i>Buteo leucocephalus</i> ;                      |
| 11. <i>Parus minor</i> ,                      |   |