

Въ Гобійско-монгольской подобласти экспедиція добыла всего 72 формы птицъ. Изъ нихъ эндемичными въ этой подобласти являются пять видовъ; къ нимъ однако необходимо прибавить *Calandrella brachydactyla dukhunensis*, гнѣздящагося почти несомнѣнно въ Гоби, но добытаго экспедиціей на осеннемъ пролетѣ въ Камѣ; *Prunella kozłowi* вѣроятно осѣдла въ Гобійскихъ хребтахъ и зимою спускается къ ихъ подошвамъ.

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Podoces hendersoni</i> , | — <i>Calandrella brachydactyla dukhunensis</i> , |
| 2. <i>Pyrgilauda davidiana</i> , | 4. <i>Prunella kozłowi</i> , |
| 3. <i>Passer ammodendri stoliczkae</i> , | 5. <i>Streptopelia douraca stoliczkae</i> . |

Далѣ слѣдуютъ три весьма характерныхъ для подобласти формы, которыя однако значительно заходятъ за ее предѣлы, причемъ первая распространена по всему Русскому Туркестану, а остальные двѣ проникаютъ въ тибетскую подобласть:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. <i>Bucanetes mongolicus</i> , | 2. <i>Pterocorys mongolica</i> , |
| 3. <i>Pseudalaudula pispolletta seebohmi</i> . | |

Затѣмъ мы имѣемъ рядъ формъ, проникающихъ въ подобласть изъ соседнихъ съ нею подобластей нагорно-азиатской области, именно изъ тибетской и манджуро-китайской:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Otocorys elwesi elwesi</i> , | 4. <i>Phasianus decollatus strauchi</i> , |
| 2. <i>Dendrocopus cabanisi cabanisi</i> , | 5. <i>Aquila chrysaëtus daphanea</i> , |
| 3. <i>Oenopopelia humilis</i> , | 6. <i>Buteo leucocephalus</i> , |

и изъ алтайско-саянской

1. *Tetraogallus altaicus*.

Болѣе широко распространенный элементъ фауны я разбиваю, какъ и при анализѣ мушино-камской и тибетской подобластей, на субтропическій и бореарктический. Первый составляютъ 27 формъ, изъ коихъ лишь семь не выходятъ изъ предѣловъ нагорно-азиатской области:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. <i>Coloeus dauricus dauricus</i> , | 4. <i>Parus minor</i> , |
| 2. <i>Emberiza godlewskii</i> , | 5. <i>Lanius sphenocercus</i> , |
| 3. <i>Alauda japonica inopinata</i> , | 6. <i>Accentor collaris erythropygus</i> , |
| | 7. <i>Caccabis chukar pubescens</i> ; |

пятнадцать широко распространены по всей восточной части субтропическаго царства или свойственны преимущественно азиатской части средиземноморской подобласти его: