

1. *Pica pica leucoptera*,
2. *Sturnus poltaratzkii*,
3. *Cynchramus pyrrhuloides*,
4. *Montifringilla alpicola*,
5. *Passer ammodendri ammodendri*,
6. *Otocorys brandti brandti*,
7. *Motacilla personata*;
8. *Cyanistes cyaneus tianschanicus*,
9. *Ruticilla erythrogenys*,
10. *Spermolegus fulvescens*,
11. *Athene bactriana*,
12. *Syrrhaptes paradoxus*,
13. *Gennaeia saceroides*,
14. *Falco barbarus babylonicus*,
15. *Aquila nepalensis*;

наконецъ, шесть формъ распространяются и въ западную часть средиземноморской подобласти:

1. *Graculus graculus*,
2. *Petronia petronia petronia*,
3. *Anthus spinoletta*,
4. *Saxicola deserti*,
5. *Saxicola isabellina*,
6. *Gypaetus barbatus*.

Изъ 30 бореарктическихъ лишь двѣ восточно-сибирскихъ формы:

1. *Turdus ruficollis*,
2. *Charadrius dominicus fulvus*;

далѣе двѣ обще-сибирскихъ и еле-еле проникающихъ въ восточную Россію:

1. *Garrulus brandti*,
2. *Ianthia cyanura cyanura*;

двѣ распространенныхъ по восточной Европѣ:

1. *Dendrocopos major cissa*,
2. *Tetrastes bonasia septentrionalis*;

наконецъ, слѣдующія 23 распространены въ западную часть царства:

1. *Corvus corax*,
2. *Corone corone*,
3. *Calcarius lapponicus*,
4. *Cynchramus schoeniclus*,
5. *Passer montanus montanus*,
6. *Alauda arvensis arvensis*,
7. *Motacilla alba alba*,
8. *Budytes flava*,
9. *Saxicola oenanthe*,
10. *Vanellus vanellus*,
11. *Squatarola helvetica*,
12. *Glottis nebularius*,
13. *Pavoncella pugnax*,
14. *Limonites temmincki*,
15. *Gallinago gallinago*,
16. *Grus grus*,
17. *Aesalon aesalon*,
18. *Tinnunculus tinnunculus tinnunculus*,
19. *Circus cyaneus*,
20. *Cygnus cygnus*,
21. *Melanonyx segetum segetum*,
22. *Mareca penelope*,
23. *Spatula clypeata*.

Въ Алтайско-саянской подобласти добыто всего 110 формъ. Изъ нихъ я не могу назвать ни одной эндемической, но къ послѣднимъ несомнѣнно относится *Tetraogallus altaicus*, распространяющійся нѣсколько въ