

этой категории было собрано в течение месячной стоянки в станциях Алтайской, лежащей в той части Алтая, которая относится уже к бореарктической области. Из них 15 достигают тут своего крайнего восточного распространения в центральную Азию (отмечены \*) или вообще к востоку (отмечены †).

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. † <i>Trypanocorax frugilegus</i> , | 8. * <i>Turdus pilaris</i> ,          |
| 2. * <i>Oriolus galbula</i> ,         | 9. * <i>Muscicapa grisola</i> ,       |
| 3. † <i>Emberiza hortulana</i> ,      | 10. * <i>Chelidon urbica</i> ,        |
| 4. † <i>Anthus arboreus</i> ,         | 11. * <i>Xylocopus minor</i> ,        |
| 5. * <i>Parus major</i> ,             | 12. * <i>Erythropus vespertinus</i> , |
| 6. † <i>Enneoctonus collurio</i> ,    | 13. <i>Circus cineraceus</i> ,        |
| 7. † <i>Sylvia sylvia</i> ,           | 14. <i>Circus macrurus</i> ,          |
|                                       | 15. <i>Circus aeruginosus</i> ;       |

восточно-сибирских форм весьма немного, именно всего шесть:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. <i>Poecile borealis macrura</i> , | 4. <i>Numenius arquatus lineatus</i> ,   |
| 2. <i>Acredula caudata macrura</i> , | 5. <i>Gallinago megala</i> ,             |
| 3. <i>Oreopneuste fuscata</i> ,      | 6. <i>Melanonyx arvensis sibiricus</i> ; |

точно также и преимущественно западно-сибирских, именно три:

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>Acanthopneuste viridana</i> , | 2. <i>Turdus atrigularis</i> ,  |
|                                     | 3. <i>Bubo bubo sibiricus</i> ; |

немногочисленны в общем и широко распространенны по Сибири формы, которые все, за исключением *Nucifraga leptorrhyncha* и *Calliope calliope*, имеют полное право гражданства и в восточной Европе:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. <i>Nucifraga caryocatactes leptorrhyncha</i> , | 5. <i>Sitta europaea uralensis</i> , |
| 2. <i>Emberiza aureola</i> ,                      | 6. <i>Calliope calliope</i> ,        |
| 3. <i>Emberiza leucocephala</i> ,                 | 7. <i>Pratincola maura maura</i> ,   |
| 4. <i>Carpodacus erythrinus erythrinus</i> ,      | 8. <i>Terekia cinerea</i> ;          |

преобладают же формы, распространенны по большей части бореарктического царства, которых насчитывается 36, а с 15 вышеприведенными — 51.

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. <i>Corvus corax</i> ,                 | 6. <i>Sylvia curruca</i> ,        |
| 2. <i>Corone corone</i> ,                | 7. <i>Cyanecula caerulecula</i> , |
| 3. <i>Passer domesticus domesticus</i> , | 8. <i>Saxicola oenanthe</i> ,     |
| 4. <i>Alauda arvensis arvensis</i> ,     | 9. <i>Picus martius</i> ,         |
| 5. <i>Calobates melanope</i> ,           | 10. <i>Jynx torquilla</i> ,       |