

8. *Nucifraga caryocatactes leptorrhyncha* БРЕНН.

с. 4500'. ♂ ♀ adlt., 14—28. VII. 1899, дол. верхней Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.

Въ совершенно свѣжемъ перѣ.

«Въ долину Бухтармы была обыкновенна и держалась преимущественно въ лѣсахъ верхняго пояса горъ».

9. *Podoces hendersoni* НУМЕ.

3710'. 2 ♂, ♀ adlt., 22—24. X. 1899, котл. оз. Орокъ-норъ, Гобійскій Алтай.  
5430'. 2 ♂, 2 ♀ adlt., 31. XII. 1899, колед. Илисэнь-худукъ, центр. Ала-шань.  
9380'. ♂ adlt., 1/2. V. 1900, хырма Барунъ-цзасака, юго-вост. Цайдамъ.  
с. 9000'. ♀ adlt., 1/3. VIII. 1901, вост. Цайдамъ.  
с. 4000'. 2 ♂ adlt., X. 1901. Средняя Гоби (между г. Дынъ-юань-инъ и оз. Харатологойнынъ-норъ).

У августовской птицы большая часть мелкаго пера уже перелиняла, но на головѣ перья еще отрастаютъ; рули всѣ смѣнены, но самая крайняя пара едва появилась, а слѣдующія три еще не дорасли, такъ что хвостъ сильно ступенчатый; четвертый махъ отрастаетъ, всѣ кнутри отъ него свѣжѣе, а три наружныхъ 1-го разряда еще старые.

Одинъ изъ самцовъ, добытыхъ въ октябрѣ въ средней полосѣ Гоби, частичный альбиносъ: самый крайній и третій снаружи рули правой стороны хвоста у него въ большей части бѣлые.

«Впервые появилась въ Гобійскомъ Алтай, въ бассейнѣ Кобдо, на рѣкѣ Суокъ, гдѣ показались и первыя *Gasella subgutturosa*; далѣе время отъ времени встрѣчалась по каменистымъ равнинамъ, саямъ, вдоль дорогъ, рѣже по долиннымъ мѣстамъ, на всемъ протяженіи Гобійскаго Алтая и Гоби до южной окраины этой послѣдней; особенно обильна была у колодца Сухайнъ-худукъ, окруженнаго песчаными холмами, прикрытыми хармыкомъ, въ началѣ января 1900 г.».

10. *Pseudopodoces humilis* (НУМЕ).

4670'. ♂ ♀ adlt., 26. I. 1900, дол. р. Чагрынъ-голъ, Нань-шань.  
с. 9000'. ♀ juv., 1/3. VIII. 1900, восточн. Цайдамъ.  
12.710'. ♂ adlt., 1—3. III. 1901, рѣчка Го-чю, прит. верхн. теч. Гэ-чю, сист. Дзэ-чю, праваго притока верхняго Меконга.  
12.020'. ♀ adlt., первая 1/2. IV. 1901, селеніе Бана-джунъ, на рѣч. Сэръ-чю, притокъ Голубой р.

Апрѣльская и майская птицы въ поношенномъ опереніи, остальные въ свѣжемъ. Молодая отличается желтизною у основанія клюва. — «Радужина темно-бурая».