

«Впервые сталъ попадаться при вступлениі экспедиціі въ Нань-шань, въ долинѣ рѣки Чагрынъ-голь; держались семьями отъ 4 до 6 особей по луговымъ уваламъ, обрывамъ и старымъ стойбищамъ. Веселая, крикливая птичка; голосъ — звонкое трещаніе».

Видъ этотъ является представителемъ и типомъ особаго рода. Недавно онъ былъ выдѣленъ въ подродъ Заруднымъ и бар. Лоудономъ *) подъ названиемъ *Pseudopodoces*, которое уже давно носилъ въ моемъ рукописномъ каталогѣ палеарктическихъ птицъ.

11. *Garrulus brandti* EVERSM.

- с. 7100'. ♀ adlt., 1—4. III. 1900, кум. Чортэнтанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.
 с. 7100'. ♂ adlt., 1—5. IX. 1901, кум. Чортэнтанъ, Нань-шань.
 2530'. ♀ adlt., 21. XI. 1901, рѣч. Ибицыкъ, къ югу отъ Кяхты.

Птица, добытая 1—5. IX, безъ признаковъ линянія, въ совершенно свѣжемъ перѣ.

«Въ Нань-шанѣ довольно обыкновенна по лѣсамъ; весною держалась парами, иногда по 2—3 пары въ близкомъ сосѣдствѣ. Строга, но отъ охотника удаляется медленно».

12. *Cyanopolius cyanus* (PALL.).

- с. 7100'. ♀ adlt., 1—4. III. 1900, кум. Чортэнтанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.
 с. 8500'. ♂ ♀ adlt., 26—27. VIII. 1901, окр. г. Синина, юго-вост. Нань-шань.
 с. 9500'. 3 ♂ adlt., кон. VIII. 1901, юго-вост. Нань-шань (вѣроятно у кум. Чойбзэнъ).

Августовскія птицы въ общемъ уже въ свѣжемъ перѣ, но у трехъ еще старые лопаточные и нѣкоторые махи; у нѣсколькихъ линяютъ перья головы, а маховые первого разряда въ пленкахъ у основанія. — «Радужина темно-бурая».

«Впервые была замѣчена на сѣверной окраинѣ Нань-шаня, по ущелью между городами Лянъ-чжоу и Гу-лянь-сянь, а затѣмъ и въ большемъ количествѣ по ущелью Мэторъ, впадающему слѣва въ Тэтунгъ-голь у кумирни Чортэнтанъ. И тамъ, и тутъ держалась обществами отъ 8—12 особей въ кустарниковыхъ заросляхъ. Весьма живая, подвижная птица, издающая громкій трескъ, болѣе благозвучный, чѣмъ у обыкновенной сороки. Послѣ выстрѣла все общество быстро исчезаетъ».

*) Ornith. Monatsber., X, 1902, p. 185.