

13. *Pica pica leucoptera* GOULD.

- 3480'. ♀ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.  
 ♀ adlt., VIII. 1899, дол. Тугюрюкь, бассейнъ Кобдо, Алтай.  
 с. 6000'. ♀ adlt., 1—4. VIII. 1899, р. Суокъ, верхнее теч. Кобдо, Алтай.  
 3180'. ♂ adlt., 23—24. IX. 1899, рѣч. Шаргинъ-голь, прит. оз. Шаргинъ-цаганъ-норъ, Гобійск. Алтай.  
 ♀ adlt., II/2. X. 1899, хреб. Ихэ-богдо къ югу отъ оз. Орокъ-норъ, Гобійскій Алтай.  
 4400'. ♀ adlt., 10—14. I. 1900, оаз. Сого-хото (Чжэнь-фань), южный Ала-шань, въ 100 в. отъ поднож. Нань-шаня.  
 с. 4000'. ♂ adlt., X. 1901, Земля Уротовъ, центральная Гоби.  
 4350'. ♂ adlt., I/3. XI. 1901, г. Урга.

Одна изъ августовскихъ птицъ уже сильно линяетъ, другая начинаетъ. Всѣхъ сорокъ, имѣющихъ крыло значительно короче 229 mm. (9.0") отношу къ этому подвиду условно, такъ какъ формы этого рода нуждаются въ коренномъ пересмотрѣ. Только у экземпляра изъ Урги есть бѣлый цвѣтъ на перьяхъ горла.

«Позднею осенью въ окрестностяхъ станицы Алтайской избиваются всѣ сороки и затѣмъ сбываются промышленникамъ на зимней ярмаркѣ по 5 до 10 коп. за шкурку, которыхъ собирается такимъ образомъ до 2000. Онѣ идутъ на украшеніе шляпокъ. — Сороки постоянно посѣщали бивуакъ во время всего путешествія».

14. *Pica bottanensis* DELESS.

- с. 7100'. ♀ adlt., 1—4. III. 1900, кум. Чортэнтанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.  
 10.660—13.500'. ♀ adlt., 17—26. V. 1900, ущ. Номохунъ-голь, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой р.  
 11.1000'. ♂ ♀ adlt., 10—18. IX. 1900, перепр. Гарту-тука, р. Дза-чю, главн. вѣтвь. Меконга.  
 11.430'. ♀ adlt., 27—30. X. 1900, р. Ному-чю, прав. прит. Меконга.  
 с. 14.000'. ♂ adlt., 23. II. 1901, верхов. р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.  
 12.020'. ♂ ♀ adlt., I/2. IV. 1901, селен. Бана-джунъ, на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.

Всѣ птицы въ болѣе или менѣе свѣжемъ нарядѣ, кромѣ майской, перо которой сильно отрепано. Длина крыла у этихъ экземпляровъ равняется у самцовъ 259—246 mm., у самокъ 244—236 mm.

Экземпляры съ Нань-шаня и изъ бассейна Желтой рѣки имѣютъ крыло въ 234 и 235 mm., но надхвостье у нихъ черное, какъ и полагается для *Pica bottanensis*, а не бѣлое, характеризующее *P. leucoptera*. Такимъ образомъ длина крыла варьируетъ у *P. bottanensis* повидимому въ предѣлахъ 234—267 (9.21—10.5). У нѣкоторыхъ по длинѣ крыла вполне типичныхъ