

*P. bottanensis* на надхвостьѣ есть слѣды бѣлаго цвѣта, но онъ не образуетъ широкой перевязи, какъ у *P. leucoptera*.

Въ Нань-шанѣ *P. bottanensis* найдена у самой границы Тибетскаго нагорья и встрѣчается тутъ бокъ-о-бокъ съ *P. leucoptera*, типичный экземпляръ которой привезенъ экспедиціей изъ оазиса Сого-хото.

«Этотъ видъ очень обыкновененъ въ бассейнѣ Меконга и тоже постоянно слѣдуетъ за караваномъ. Такъ, птицы не отставали отъ насъ на всемъ пути отъ Барь-чю по рѣчкѣ Цатимъ и далѣе по долинѣ Ному-чу. Двѣ сороки сопутствовали А. Н. Казнакову туда и обратно изъ долины Барь-чу въ долину Джи-чю. — Тангуты называютъ сороку «ша-га».

### Сем. **Sturnidae.**

#### 15. **Sturnus poltaratzkii** FINSCH.

3740'. 3 ♂ adlt., 27. VIII. 1899, южн. берег. оз. Кара-усу, Алтай.  
с. 6500. ♀ adlt., 16—17. IX. 1899, оз. Тунь-куль къ в. отъ оз. Хулму-норъ, Гобійскій Алтай.

Повидимому всѣ экземпляры взрослыя птицы въ зимнемъ нарядѣ и съ темнымъ клювомъ.

«Кочующія стада наблюдались въ долинѣ р. Кобдо; у озера Кара-усу тоже держался большими стаями; далѣе небольшая стайка была встрѣчена 11 сентября на оз. Хулму-норъ, а одиночный экземпляръ 18 сентября на оз. Тунь-куль».

#### 16. **Spodiopsar cineraceus** (TEMM.).

6070'. 3 ♂, ♀ adlt., 19. IX. 1901, сел. Сы-эръ-тань-пу, къ с.-в. отъ гор. Куань-гоу-ченъ, сѣв. окраин. Нань-шаня.

Въ свѣжемъ зимнемъ нарядѣ и съ темнымъ клювомъ. Три птицы старыя, одна взрослая, но помоложе, съ малымъ количествомъ аспиднаго цвѣта на шеѣ и груди. Мѣняются послѣднія изъ маховыхъ, именно внѣшніе махи перваго разряда.

Во время экспедиціи встрѣченъ, повидимому, лишь однажды. «Стайка штукъ въ 7—8 держалась на полѣ, временами взлетая на одиноко стоящіе тополя. Возможно, что птицы эти были пролетныя».

### Сем. **Oriolidae.**

#### 17. **Oriolus galbula** LINN.

3480'. 2 ♂ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.

«Гнѣздилась въ заросляхъ по берегамъ р. Сарымъ-сакты».