

Сем. **Fringillidae.**18. **Calcarius lapponicus** (LINN.).

- 7220'. 2 ♂ adlt., 14. IX. 1899, оз. Хулму-норь, Гобійской Алтай.
 4100'. ♂ adlt., 1—2. X. 1899, котл. оз. Бегерь-норь, къ сѣв. отъ хрб. Бурхань-Будда въ Гобійскомъ Алтай.
 с. 3000'. 2 ♂ adlt., semiadlt., 17. XII. 1899, уроч. Хо-морито, сѣв. Ала-шань (центр. Гоби).
 4400'. ♂ adlt., 10—14. I. 1900, оаз. Сого-хото (Чжэнь-фань), южн. Ала-шань.

Всѣ птицы въ свѣжемъ зимнемъ перѣ, кромѣ январьской, которая уже въ нѣсколько обношенномъ. Полузрелый декабрьскій самецъ помѣченъ неправильно самкой.

«Впервые замѣчены въ долинѣ озера Хулму-норь 14. IX; держались стайками до 10 штукъ и болѣе въ травянистыхъ заросляхъ; отъ наблюдателя прятались, прижимаясь вплотную къ землѣ. Затѣмъ встрѣченъ зимою въ центральной Гоби во время стужи при леденящемъ сѣверо-западномъ вѣтрѣ; птички тянулись по одиночкѣ къ югу и съ жалобнымъ крикомъ опускались на снѣгъ за кустарники; онѣ очевидно страдали и чуть не сами отдавались въ руки охотнику. Наконецъ, наблюдались при вступленіи въ культурную полосу Китая въ оазисъ Сого-хото; здѣсь онѣ нерѣдко примѣшивались къ стайкамъ *Otocorys elwesi*.

19. **Synchramus schoeniclus** (LINN.).

- 4400'. ♂ adlt., 10—14. I. 1900, оаз. Сого-хото (Чжэнь-фань), южн. Ала-шань.

Черный цвѣтъ головы и зоба еще почти совершенно скрытъ свѣтлыми кончиками, но рули и махи нѣсколько пообносились. Длина крыла 83.5 mm. (3.30"); вообще отпосится къ типичной формѣ.

20. **Synchramus pyrrhuloides** (PALL.).

- 3180'. ♀ (♂) adlt., 23—24. IX. 1899, р. Шаргинь-голь, прит. оз. Шаргинь-цагань-норь, Гоб. Алтай.
 2740'. ♂ ♀ adlt., 18—20. XII. 1899, кол. Дэнгинь-худукъ, сѣв. Ала-шань.

Всѣ въ свѣжемъ зимнемъ нарядѣ.

«По р. Шаргинь-голь ютились по кустарнымъ зарослямъ въ сосѣдствѣ саксаульныхъ воробьевъ. У колодца Дэнгинь-худукъ, на сѣверной границѣ обширныхъ песковъ Бадань-джаренгъ, птицы держались на окружающихъ его песчаныхъ холмахъ, поросшихъ саксауломъ и камышемъ».