

росломъ кустарникѣ. Самецъ съ больной ногой добытъ у тангутскихъ жилищъ въ заросли травъ», на мѣстѣ зимовки въ урочищѣ Лунъ-ток-ндо.

*Emberiza* nulli speciei cognitae sat affinis, sed ab omnibus speciebus subcaudalibus cinnamomeis abdomine fulvescenti-albido multo saturioribus et loris mentoque castaneis a gula superciliisque latis longissimisque albis et pileo, genis auricularibusque nigris (♂) vel cinerascenti-brunneis (♀) valde discrepantibus primo visu distincta.

Mas ptil. hiem. Pileo toto parteque superiore cervicis nigris, marginibus plumarum verticis, occipitis et cervicis fulvescenti-cinereis; supercilio a rostro ad cervicem superiorem, post oculum multo latiore, albo, apicibus plumarum nonnullarum nigris; loris mentoque castaneis; genis, auricularibus parteque lateris colli adjacenti nigris; torque cervicali cinerascenti, apicibus plumarum castaneis; interscapulio, tergo, scapularibusque castaneis, marginibus plumarum cinerascenti-fulvescentibus; uropygio supracaudalibusque fulvescenti-cinereis, plumis in medio nigricantibus. Tectricibus alarum minoribus cinereis, medio nigricantibus; mediis nigris, apicibus albescentibus fasciam alarem sat distinctam formantibus; majoribus pogonio externo castaneo, pogonio interno nigro, apicibus fulvescentibus; tectricibus primariarum fuscis, margine exteriori cinerascenti; primariis fuscis, margine primae albo, marginibus aliarum albescenti-cinnamomeis; secundariis fere nigris, marginibus cinnamomeis; tertiariis nigris, pogonio externo latissime cinnamomeo fulvescentique marginato, pogonio interno cinnamomeo limbato; pogoniis externis remigum primariarum 2—5 valde, 6 — nonnihil emarginatis et solum 7 intacto. Rectricibus duabus mediis, extimis nonnihil longioribus, nigris, sat late fulvescenti limbatis, 2—2 omnium longissimis, 3,3—4,4-que paululum brevioribus nigris; penultimis in parte tertia basali pogonii externi nigris, in parte tertia apicali infuscatis, ipso apice albis, pogonio interno dimidio basali oblique nigris, dimidio apicali triangulariter albis, rhachide nigra; rectricibus externis omnium brevissimis, penultimisque circa 4 mm. brevioribus in quadrante basali pogonii externi nigris, deinde albis, fere dimidio apicali fuscis, ipso apice albo, in pogonio interno basi oblique nigris,  $\frac{2}{3}$  apicalibus triangulariter albis. Gulâ, jugulo parteque adjacenti lateris colli albis nonnihil apicibus nigris plumarum nonnullarum variegatis, torque pectorali nigrâ, apicibus plumarum cinereis, pectore hypochondriisque cinereis plus minusve fulvescentibus; abdomine dilute-fulvescenti, plumis basi fuscis, deinde albis, apice fulvescentibus; subcaudalibus abdominis multo saturioribus, cinnamomeis, in pogonio externo pallidioribus; axillaribus albis; tectricibus alae inferioribus albis, tectricibus manus superficieque alae inferiore cinereis.