

Femina ptil. aestiv. valde abrupta. Pileo toto parteque adjacenti cervicis, genis, auricularibus parteque lateris colli adjacenti brunneis, marginibus plumarum fere deficientibus pallidioribus vel cinerascentibus; supercilio a rostro ad cervicem superiorem producto, post oculum multo latiore, sordide-albo; loris mentoque castaneis; torque cervicali fulvescenti-cinerea; interscapulio scapularibusque castaneis, plumis in medio fuscis; uropygio supracaudalibusque cinereis; alis ut in mare coloratis; rectricibus penultimis pogonio externo nigro, pogonio interno nigro, triangulo albo fere ad medium plumae producto albo ornato; rectricibus externis pogonio externo ad basin nigro, deinde albo, parte tertia apicali fusco, ipso apice albo, pogonio interno dimidio basali oblique nigro, dimidio apicali triangulariter albo; gula, jugulo parteque lateris colli sordide albis; torque pectorali nigricanti; pectore hypochondriisque sordide cinereis, plumis novis crescentibus dilute-fulvescentibus; abdomine albescenti-fulvescenti, subcaudalibus cinnamoneis in pogonio externo fulvescentibus; axillaribus tectricibusque alae inferioribus ut in mare coloratis.

Rostro hyeme et aetate similiter colorato, corneo, mandibulâ ad basin pallidiore; tarsi testaceis, digitis obscurioribus, fuscescenti-testaceis, unguibus corneis.

Dimensiones:	Lg.	Ul.	Cd.	Tars.	Culmen.	Lg.*)	Lt.*)
♂	c. 205 (8.00);	97 (3.82);	97 (3.82);	22 (0.86);	12 (0.47).	—203 (8.0)	279 (11.0)
♀ (VIII)	c. 193 (7.60);	91 (3.58);	90 (3.54);	22 (0.86);	12 (0.47).	—180 (7.1)	229 (9.0)
♀ (IX)	c. 195 (7.70);	89.5 (3.50);	87 (3.42);	22 (0.86);	12 (0.47).	—170 (6.7)	229 (9.0).

Цвѣтъ голыхъ частей тѣла по П. К. Козлову слѣдующій: «радужина-бурая или темно-бурая; клювъ сѣрый, по коньку темный; ноги мясного цвѣта или блѣднаго мяснаго».

27. *Urocynchramus pylzowi* PRZEW.

- 15.140'. ♂ adlt., 24. III. 1901, перев. Мири-ла, водор. рр. Намъ-чю и И-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой.
- с. 13.500'. 2 ♂ adlt., 30. IV. 1901, рѣч. Раби-чу, прит. Гэ-чю, лѣв. прит. Дза-чю, сист. Голубой р.
- с. 13.500'. 4 ♂, ♀ adlt., 1/3. V. 1901, сѣверн. лѣв. притоки Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
- с. 12.000'. ♂ (♀) juv., 15—18. VIII. 1901, Южно-кукунорскій хребетъ.

Майскія птицы отрепаны уже довольно сильно. У августовской молодой птицы началась смѣна мелкаго пера: по бокамъ груди пробилась уже красныя перья, благодаря которымъ и удалось опредѣлить ея полъ.

*) Эти размѣры по П. К. Козлову, но для самокъ врядъ ли точны.