

«Въ мартѣ 1900 г. была встрѣчена въ Южно-Кукунорскомъ хребтѣ. — По обѣ стороны перевала Мири-ла держалась парочками или обществами въ 6—8 особей по ущельямъ, склоны которыхъ были одѣты кустарниками. По рѣчкѣ Раби-чю найдена немного ниже перевала «мокраго»; здѣсь птички были очень обыкновенны и держались, какъ и *Calliope tschebajewi*, по руслу и по береговымъ склонамъ рѣки, поросшимъ кустарникомъ. Самцы усердно пѣли, помѣстившихъ на вершинѣ куста».

28. *Carpodacus erythrinus erythrinus* (PALL.).

- 3480'. 2 ♂ adlt., 11/2. VI. 1899, станица Алтайская.
с. 4500'. ♀ adlt., 11/2. VII. 1899, дол. р. Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.
с. 6000'. (♀) juv., кон. VII. 1899, р. Суокъ, верхн. теч. Кобдо, Алтай.

«Въ окрестностяхъ станицы Алтайской гнѣздится не только въ прибрежныхъ заросляхъ, но и въ домахъ, подобно воробью».

29. *Carpodacus erythrinus grebnitzkii* STEJNEG.

- с. 12000'. ♂ adlt., 5. IX. 1900, р. Дза-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.
7100'. (♀) juv., 1—5. IX. 1901, кум. Чортэнтанъ, басс. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

Взрослый самецъ въ лѣтнемъ, хорошо сохранившемся перѣ, безъ всякихъ признаковъ линянiя, молодая птица — въ совершенно свѣжемъ гнѣздовомъ, окончательно уже развившемся. Всѣ цвѣта у послѣдней интенсивнѣе, чѣмъ у молодой *C. erythrinus*, и въ общемъ она много рыжѣе и темнѣе.

«Какъ въ бассейнѣ Голубой рѣки, такъ и въ бассейнѣ Меконга встрѣчалась изрѣдка по кустарнымъ и лѣснымъ зарослямъ».

30. *Carpodacus sewertzowi* SHARPE.

- с. 9500'. ♂ adlt., IV. 1900, восточный Цайдамъ.
9380'. 2 ♂ adlt., 1/2. V. 1900, восточный Цайдамъ.
с. 14.000'. ♀ adlt., 6—11. VI. 1900, хреб. Амнэнъ-коръ, басс. Желтой рѣки.
12.860'. ♂ adlt., 27—30. VII. 1900, р. И-чю, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
10.910'. ♂ ♀ adlt., VII. 1901, ущ. Хату, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой рѣки.

Юльскія птицы сравнительно въ мало отрепанномъ перѣ, безъ признаковъ линянiя.

«Наблюдалась кромѣ мѣстъ, откуда происходятъ экземпляры, еще въ сѣв.-вост. Гань-су и горахъ, окаймляющихъ Цайдамъ съ юга, гдѣ птицы были особенно обыкновенны и держались по кустарнымъ зарослямъ при