

устяхъ ущелій. Въ восточномъ Цайдамѣ ютились у построекъ мѣстной хырмы (крѣпости)».

Самостоятельность этого вида не подлежитъ теперь для меня никакому сомнѣнію; отличія его отъ *C. rubicilloides* бросаются въ глаза съ перваго взгляда даже при сравненіи птицъ, убитыхъ въ одинъ и тотъ же мѣсяць (но удаленныхъ по мѣстонахожденію). Длина крыла единственной добытой экспедиціей самки, равна 109.5 mm. (4.33").

31. *Carpodacus rubicilloides* PRZEW.

- с. 13.000'. ♂ adlt., 10—21. VII. 1900, рѣч. Хи-чю, лѣв. прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
 с. 15.000'. 2 ♀ adlt. & juv., 28. VIII. 1900, рѣч. Ёнырь-чю, сист. Дзэ-чю, прав. прит. Дза-чю или верхняго Меконга.
 с. 11.000'. 2 ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.
 11.960'. ♀ adlt., I. 1901, уроч. Лунъ-ток-ндо на р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
 с. 13.000'. 2 ♂ adlt., 26—28. II. 1901, верхов. р. Гэ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. верхн. Меконга.
 12.020'. 3 ♂, ♀ adlt., 1/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.
 с. 12.000'. ♂ adlt., 1/2. IV. 1901, р. Дза-чю, прит. Голубой рѣки.

Августовскія самки сильно линяютъ, ноябрьскіе самцы въ совершенно свѣжемъ зимнемъ перѣ, остальные птицы въ болѣе или менѣе потертомъ.

Длина крыла 11 ♂ равна 104.5—113 (4.13—4.45), а у 5 ♀ отъ 97 до 103.5 mm. (3.82—4.08").

«Впервые замѣчена при вступленіи въ систему Голубой рѣки на высотѣ 13.500', но убита лишь при урочищѣ Донъ-ра; птичка сравнительно строга; голосомъ она немного отличается отъ *C. sewertzowi*. — На рѣкѣ Дза-чю, уже въ системѣ Меконга, въ окрестностяхъ Чамдо, на высотѣ 10.500' наблюдалась въ первой трети ноября стайками отъ 3 до 6 особей и держалась по кустарникамъ богатымъ ягодами и сѣменами. На рѣкѣ Рэ-чю во время зимовки въ урочищѣ Лунъ-ток-ндо была очень рѣдка, такъ что за все время была добыта лишь одна самка».

32. *Carpodacus trifasciatus* VERR.

- с. 11.000'. 2 ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.
 11.960'. ♂ adlt., 1/2. XI. 1900, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
 11.960'. 3 ♂ adlt., 1/3. II. 1901, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

Всѣ птицы въ свѣжемъ зимнемъ перѣ.

«Впервые наблюдался и добытъ въ долинѣ рѣки Дза-чю на высотѣ