

10.500'. Далѣе наблюдался изрѣдка на р. Дэ-чю, куда прилеталъ пить рано утромъ, еще до освѣщенія солнцемъ этой части ущелья; напившись, птички отправлялись кормиться ягодами одного куста. На мѣстѣ зимовки въ урочищѣ Лунъ-ток-ндо, на рѣчкѣ Рэ-чю, появлялись время отъ времени по одиночкѣ или стайками до 3 штукъ на водопой самцы, но самокъ вовсе не было замѣчено».

33. *Carpodacus pulcherrimus* (MOORE).

- 7.100'. ♂ adlt., II. 1900, кум. Чортэнтанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.
 12.610'. ♀ s. ♂ adlt., 23. VII. 1900, р. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
 с. 13.000'. ♂ 3 adlt., 30—31. VIII. 1900, рѣч. Чокъ-чю, сист. Дзэ-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.
 pull., 31. VIII. 1900, водоразд. хреб. между Голубой рѣкой и Меконгомъ.
 с. 12.000'. ♂ adlt., 2 ♀ juv., 1—6. IX. 1900, р. Дзэ-чю, прав. прит. Дза-чю или верхн. Меконга,
 13.040'. ♂ adlt., III/3. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Дза-чю (Меконга).
 11.430'. ♀ adlt., 27—30. XI. 1900, р. Ному-чю, прав. прит. Дза-чю или верхн. Меконга.
 с. 11.000'. ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ гор. Чамдо.
 11.960'. ♂ adlt., XII. 1900, уроч. Лунъ-ток-ндо на р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
 12.020'. ♂ adlt., 1/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.

Іюльская самка въ очень истрепанномъ перѣ и начала мѣнять маховыя перья; августовскіе самцы сильно линяютъ, мѣняя какъ мелкое перо, такъ и рули и махи; у добытаго съ ними одновременно птенца маховыя и рулевыя еще не отрасли, послѣднія достигли $\frac{3}{4}$ длины; самецъ, убитый въ началѣ сентября, въ общемъ еще въ лѣтнемъ перѣ, но началъ мѣнять махи и часть мелкаго оперенія; молодыя птицы того же времени еще въ рыхломъ гнѣздовомъ, но окончательно отросшемъ перѣ; самецъ, добытый въ послѣдней трети сентября, въ общемъ уже въ зимнемъ перѣ, но закончилъ линяніе еще не вполнѣ; октябрьская самка, ноябрьскіе и декабрьскіе самцы въ прекрасномъ зимнемъ нарядѣ; февральскіе самцы еще тоже, но апрѣльскій уже поотрепалъ опереніе и, можно сказать, съ лѣтними отгѣнками.

Птенецъ совершенно похожъ на самку, но соловый цвѣтъ у него болѣе бураго отгѣнка, что особенно бросается въ глаза на широкихъ каймахъ маховъ второго и третьяго порядка. Молодыя птицы лишь едва рыжѣе взрослой самки въ свѣжемъ зимнемъ нарядѣ.

«Въ февралѣ мѣсяцѣ у Чортэнтана держались стайками въ 8—12 штукъ по кустарнымъ зарослямъ горныхъ ущелій и узкихъ глубокихъ долинъ».