

34. *Carpodacus dubius* PRZEW.

- 7100'. ♂, ♀ adlt., II и III. 1900, кум. Чортэтань, басс. р. Тэтунгь-голь, Нань-шань.
- с. 11.000'. 2 ♀ adlt., III. 1900, хреб. Южно-Тэтунгскій, Нань-шань.
- 10.000'. ♂ adlt., 5—6. IV. 1900, кум. Дулань-китъ, южн. окр. Южно-Кукунорскаго хрб.
- 13.040'. ♂ adlt., III/з. IX. 1900, р. Барь-чю, прит. Ному-чю, сист. Дза-чю или верхн. Меконга.
- с. 11.000'. ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.
- 11.960'. 2 ♂, ♀ adlt., II/з. XI. 1900, рѣч. Дэ-чю, впад. въ Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
- 12.020'. ♀ adlt., I/з. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.
- с. 12.000'. ♂ adlt., II/з. IV. 1901, р. Дза-чю, прит. Голубой рѣки.
- 10.000'. ♂ ♀ adlt., II/з. VIII. кум. Дулань-китъ, южн. окр. Южно-Кукунорскаго хрб.

Августовскія птицы въ сильно отрепанномъ перѣ, но линять еще не начали.

«Начала попадаться при вступленіи въ сѣверную окраину Нань-шаня, гдѣ держалась въ среднемъ поясѣ горъ въ полосѣ кустарниковъ или хвойнаго лѣса; еще обыкновеннѣе она была въ ущельяхъ рѣки Ярлыкь-голь и особенно въ окрестностяхъ кумирни Чортэтань. — Въ бассейнахъ Голубой рѣки и Меконга тоже довольно обыкновенна, но лишь тамъ, гдѣ есть кустарныя или древесныя заросли, хотя бы состоящія изъ *Juniperus pseudo-sabina*. Въ сел. Бана-джунъ встрѣчались исключительно самки, ростомъ замѣтно превосходившія наньшаньскихъ самцовъ».

35. *Bucanetes mongolicus* (SWINH.).

- с. 5500'. 5 ♂, ♀ adlt., 4 juv., 4. VIII. 1899, дол. верхн. теч. р. Кобдо, Алтай.
- с. 5000'. 2 ♂ adlt., ♂, ♀ juv., 10. VIII. 1899, кл. Цагань-бургусутайнынъ-булыкъ къ с. отъ гор. Кобдо, Алтай.
- с. 4000'. 2 ♂ juv., X. 1901, центральная Гоби.

Четыре самца съ верхней Кобдо въ сильно истрепанномъ опереніи и два изъ нихъ начали мѣнять махи; пятый самецъ сильно линяетъ, но въ общемъ уже въ зимнемъ нарядѣ; самка съ Кобдо въ сильно потертомъ перѣ, но линять еще не начала, на головѣ и шеѣ у нея отдѣльныя *бѣлыя* перышки; молодыя птицы съ Кобдо въ рыхломъ гнѣздовомъ перѣ, еще не линяютъ, у двухъ изъ нихъ уже вполне явственъ на каймахъ внѣшняго опахала маховъ перваго разряда розовый цвѣтъ, который развивается слѣдовательно безъ смѣны пера (маховъ молодыя осенью не мѣняютъ). Одинъ изъ взрослыхъ самцовъ, добытыхъ у ключа Цагань-бурзусутай, въ зимнемъ