

перѣ и мѣняетъ послѣдніе махи и рули (потому онъ adlt., а не juv., какъ помѣчено на этикетѣ); у другого верхъ головы, шея и межлопаточная область въ отрепанномъ лѣтнемъ перѣ (почему онъ adlt., а не juv., какъ отмѣчено на этикеткѣ), остальное мелкое опереніе и часть маховъ и рулей уже свѣжіе; двѣ молодыя птицы (маховъ не мѣняютъ) перебираются во взрослый нарядъ, одна изъ нихъ не ♀ (какъ помѣчено на этикеткѣ), а ♂, такъ какъ на надхвостьѣ развитъ розовый цвѣтъ, характерный именно тутъ для самца и отсутствующій у самокъ. Октябрьскіе экземпляры въ свѣжемъ зимнемъ перѣ, но, судя по сравнительно уже сильно отрепаннымъ перьямъ крыла, птицы даннаго года.

«На верхней Кобдо держались стайками штукъ до 10—15, состоявшими какъ изъ взрослыхъ, такъ и изъ молодыхъ птицъ, по склонамъ у кустарныхъ зарослей. По утрамъ летаютъ на водопой, гдѣ ихъ удобнѣе всего стрѣлять».

### 36. *Pyrrhospiza longirostris* PRZEW.

- с. 14.000'. 2 ♂, 2 ♀ adlt., 6—11. VI. 1900, хреб. Амнэнъ-коръ, басс. Желтой рѣки.  
с. 14.000'. 2 ♂, 2 ♀ adlt., 4—6. VI. 1901, хреб. Амнэнъ-коръ, басс. Желтой рѣки.

«Впервые наблюдался въ Южно-Кукунорскомъ хребтѣ. — Въ Амнэнъ-корѣ держались по склонамъ и розсыпямъ или на сосѣднихъ съ ними луговыхъ площадкахъ поодиночкѣ или парами; только разъ была замѣчена группа въ 4 особи, состоявшая исключительно изъ самокъ. — Въ концѣ іюля 1900 года замѣченъ по отвѣсно ниспадавшимъ скаламъ горы Ніэрчи на рѣчкѣ И-чю, впадающей въ Голубую».

Наблюденія въ Амнэнъ-корѣ указываютъ, что птицы въ это время гнѣздились и вѣроятно выкармливали уже птенцовъ, часть которыхъ уже вылетѣла и держалась выводкомъ, состоявшимъ изъ 4 особей.

### 37. *Loxia himalayana* HODGS.

- с. 12.000'. 4 ♂ adlt., 1—6. IX. 1900, р. Дза-чю, прав. прит. Дза-чю или верхн. Меконга.  
13.040'. 2 ♂ adlt., 27. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Дза-чю (Меконга).  
13.040'. ♂ adlt., 1/2. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю.  
с. 11.000'. ♂ adlt., 1 juv., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.  
12.610'. ♂ adlt., 7—9. III. 1901, рѣч. Сэнъ-чю, прав. прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.  
с. 13.000'. ♀ adlt., 19—21. III. 1901, р. Нанъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.  
12.960'. 2 ♂ semadlt., ♀ adlt., 26—27. III. 1901, р. И-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.