

и самка почти совершенно сходны. Отношение между самцом и самкой по окраске точно такое же, какъ у половъ *Carpodacus*, *Pyrrhospiza* etc. и различіе это продолжается кромѣ того на цвѣтъ клюва по крайней мѣрѣ лѣтомъ.

У самки перья всего верха тѣла, отъ лба до верхнихъ кроющихъ хвоста включительно, бураго цвѣта съ болѣе или менѣе широкими свѣтлыми краями обоихъ опахалъ, на головѣ, шеѣ, плечахъ и спинѣ оставляющими свободной самую вершину пера, но на надхвостьѣ и верхнихъ кроющихъ хвоста окаймляющими и ее; эти свѣтлыя каймы на головѣ и зашейкѣ рыжевато-соловья, у птицъ въ болѣе поношенномъ перѣ бѣловато-соловья особенно на послѣднемъ; на лопаточной и межлопаточныхъ областяхъ со- лово-рыжія, въ отрепанномъ перѣ бѣлесоватыя; на надхвостьѣ бѣловато-соловья, въ болѣе поношенномъ перѣ грязно-бѣлыя или сѣровато-бѣлыя. Кроющія крыла болѣе свѣтлаго бураго цвѣта съ бѣловато-соловыми или грязно-бѣлыми ободками и каймами, на среднихъ и большихъ кроющихъ образующими не особенно рѣзкія перевязи на крылѣ. Маховыя бурья съ такими же стержнями, узкими бѣловатыми оторочками на внѣшнемъ опахалѣ маховъ 1-го разряда, болѣе широкими у маховъ 2-го разряда и рас- пространяющимися и на конецъ внутренняго опахала на махахъ 3-го раз- ряда; снизу махи много блѣднѣе, а по краю внутренняго опахала бѣловаты. Рулевья бурья съ соловыми или бѣловатыми оторочками, на самыхъ край- нихъ руляхъ образующими болѣе широкую кайму, не занимающую однако болѣе трети ширины наружнаго опахала. Перья боковъ головы и шеи такія же, какъ на верхней сторонѣ головы, но вокругъ глазъ образуютъ неявственное рыжевато-соловое кольцо; подбородокъ и прилежащая часть горла бѣловато-соловые, но перья большей части горла и зоба блѣдно-бурья съ очень широкими свѣтлыми, сходящимися на вершинѣ каймами, такъ что лучше сказать, что перья этихъ частей соловья въ бурыхъ наствольяхъ; на груди и бокахъ тѣла каймы перьевъ блѣднѣе, въ поношенномъ нарядѣ грязно-бѣловатыя; брюхо и голени соловья или солово-бѣлыя, безъ тем- ныхъ наствольевъ на перьяхъ; нижнія кроющія хвоста соловья или почти бѣлыя въ бурыхъ наствольяхъ; нижнія кроющія крыла почти чисто бѣлыя, кромѣ мелкихъ перышекъ у края крыла, которыя имѣютъ темную середину. Клювъ ярко-желтый, кончикъ его затемненъ; ноги черныя; радужина «темно-бурая».

40. *Leucosticte haematopygia* GOULD.

9350'. 3 ♂, 2 ♀ adlt., 9—12. III. 1900, кум. Чойбзэнъ, басс Сининъ-хэ, Нань- шань.

10.660—16.040'. ♂ ♀ adlt., 17—27. V. 1900, хреб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой рѣки.
с. 14.000'. ♀ adlt., 6—11. VI. 1900, хреб. Амнэнъ-коръ, басс. Желтой рѣки.