

15.700'. ♀ adlt., 24—25. VIII. 1900, водоразд. хреб. Голубой рѣки (Ды-чю) и Меконга.

12.710'. 2 ♂, 2 ♀ adlt., 2. III. 1901, верх. р. Гэ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. верхн. Меконга.

Августовская птица въ общемъ еще въ лѣтнемъ нарядѣ, но успѣла уже смѣнить нѣкоторыя перья хвоста и крыльевъ. Клювъ у майскихъ и юньскихъ птицъ черный, у августовской же и мартовскихъ частью еще желтый, кромѣ одной, у которой уже черенъ.

«У кумирни Чойбзанъ замѣчена стая въ 70—100 особей, державшихся по сосѣдству скалистыхъ горъ, но кормившихся на поляхъ вѣроятно потому, что въ горахъ выпалъ временно снѣгъ. — Въ бассейнѣ Меконга была очень обыкновенна и держалась постоянно большими стаями до сотни и болѣе экземпляровъ. Въ лѣтнее время это чуть ли не единственная обитательница переваловъ, но глубокой снѣгъ заставляетъ птичекъ спускаться съ горъ и кормиться у кочевки туземцевъ на разрыхленной почвѣ, нерѣдко въ сообществѣ съ *Pyrgilauda*, *Otocorys* и т. д.»

Ни у одной изъ птицъ, привезенныхъ экспедиціей, нѣтъ красныхъ ободковъ на малыхъ кроющихъ крыла, хотя всѣ птицы старыя и у мартовскихъ экземпляровъ перья эти не настолько отрепаны, чтобы могли исчезнуть всѣ слѣды краснаго цвѣта. Формы этой группы *Leucosticte* будутъ рассмотрены мною въ обработкѣ птицъ экспедицій М. Н. Пржевальскаго, теперь же скажу только, что обширный матеріалъ, состоящій болѣе, чѣмъ изъ 150 шкурокъ, изъ всей области распространенія этой группы заставляетъ меня считать *L. haematorugia* формой, отличимой отъ *L. brandti*, но въ то же время соединять съ послѣдней *L. pamirensis*. Въ предѣлахъ русскаго Туркестана *L. haematorugia* не встрѣчается: системамъ Тянь-шаня, Памира и Гинду-куша свойственна *L. brandti*, взрослыя особи которой всегда имѣютъ красныя ободки на малыхъ кроющихъ крыла, въ западномъ же Куэнь-лунѣ, Цайдамѣ, Нань-шанѣ, въ сѣверномъ и восточномъ Тибетѣ и въ Гималаяхъ, но пока неизвѣстно какъ далеко тутъ на западъ, водится *L. haematorugia* безъ красныхъ ободковъ на малыхъ кроющихъ крыла или съ незначительными слѣдами розоваго въ самомъ свѣжемъ зимнемъ нарядѣ. Мнѣніе Шарпе¹⁾, что у *L. haematorugia* въ зимнемъ перѣ красныя ободки малыхъ кроющихъ крыла «are, however, so much more plain», основано повидимому на февральскихъ птицахъ изъ Гильгита, находящагося въ предѣлахъ распространенія именно *L. brandti*.

1) Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 271.