

41. *Onychospiza taczanowskii* PRZEW.

с. 11.000'. ♀ adlt., 25—30. III. 1900, сѣв. бер. оз. Куку-норъ.

13.340'. ♂, ♀ adlt., 26. II. 1901, верх. р. Гэ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. верхн. Меконга.

13.830'. 3 ♂ adlt., 11—13. V. 1901, рѣч. Кундуръ-чю, лѣв. сѣверн. прит. Дза-чю, сист. Голубой.

Клювъ у всѣхъ экземпляровъ «блѣдно-голубой; ноги очень темнаго свинцоваго цвѣта», на шкуркахъ — черныя съ едва замѣтнымъ синимъ оттѣнкомъ; радужина «коричневая».

«Подобно видамъ рода *Pyrgilauda* этотъ выюрокъ сталъ встрѣчаться тотчасъ же по прибытіи экспедиціи на верховье Донкыръ-хэ (Донгэръ-хэ или Цункугъ-голь), на Кукунорскомъ плато, гдѣ степная мѣстность уже совершенно тождественна со степями Куку-нора и представляетъ луговые увалы и долины съ оголенными отъ растительнаго покрова площадями по берегамъ рѣкъ, гдѣ особенно много *Lagomys*. Птички живутъ дружно со звѣрками и въ холодную, вѣтряную погоду прячутся въ норки грызуновъ.

«Въ Камѣ встрѣчались повсюду, гдѣ только мѣстность носила характеръ, свойственный Тибетскому нагорью, начиная съ 12,000' абсолютной высоты. Птички держались вмѣстѣ съ *Pseudopodoces humilis*, *Pyrgilauda* и *Montifringilla*».

42. *Pyrgilauda davidiana* VERR.

4490'. ♀ juv., 12—25. VIII. 1899, р. Буянту у г. Кобдо, Алтай.

с. 7000'. 2 ♂, ♀ adlt., 3. IX. 1899, кол. Таботынъ-атаги-худукъ, зап. ок. хрб. Алтайнъ-нуру, Гоб. Алтай.

Всѣ въ свѣжемъ зимнемъ нарядѣ, у августовской птички линяютъ послѣдніе махи и рули. У самокъ черное поле на горлѣ и лбу развито слабѣе, чѣмъ у самцовъ, у одного изъ которыхъ бѣлые ободки на перьяхъ выражены очень слабо. Клювъ у всѣхъ свинцовый, кончикъ черный, основаніе нижней челюсти съ желтизной.

«Началъ попадаться уже въ бассейнѣ верхней Кобдо и держался одиночными особями или парочками далеко отъ рѣки, чаще всего въ сопровождающихъ ее горкахъ. На рѣчкѣ Буянту держался съ *Montifringilla alpicola*.

«Въ Гобійскомъ Алтайѣ встрѣчался въ пустынной мѣстности, иногда далеко отъ воды и особенно часто наблюдался у колодца Тыметынъ-худукъ, куда прилеталъ на водопой значительными стайками съ сосѣднихъ горъ».

У молодыхъ птицъ этого вида, какъ и у другихъ видовъ рода *Pyrgilauda*, черный цвѣтъ на лбу вовсе не развитъ, но темное поле на горлѣ слегка намѣчено даже у самыхъ молодыхъ. Въ этомъ нарядѣ Н. М. Пржеваль-