

скій принялъ *P. davidiāna* за новый видъ и назвалъ его *P. kansuensis*. Типы его оказались однако вовсе не старыми, а молодыми птицами въ гнѣздовомъ перѣ и совершенно тождественными съ молодымъ *P. davidiāna* коллекціи Сѣверцова изъ с.-з. Монголіи (р. Ширэ, $\frac{1}{13}$. VII). Судя по экземпляру, добытому М. М. Березовскимъ въ декабрѣ мѣсяцѣ въ г. Кобдо, молодыя птицы не имѣютъ чернаго лба и въ первую зиму, такъ что взрослый нарядъ надѣваютъ лишь во вторую осень. Клювъ желтый, какъ и у птенцовъ. Всѣ три до сихъ поръ известныхъ вида рода *Pyrgilauda* легко различаются уже въ первомъ нарядѣ. Даю диагностическую табличку для отличія птицъ во всякомъ возрастѣ въ виду того, что въ литературѣ имѣется только ключъ для опредѣленія взрослыхъ.

a. Межлопаточная область одноцвѣтная, безъ темныхъ продольныхъ полосокъ.

Клювъ много массивнѣе и короче: высота его почти равна длине оголеннаго culmen'a; сбоку отрѣзокъ его до линіи, соединяющей уголъ нижней челюсти съ опереніемъ на culmen'ѣ, представляетъ равносторонній треугольникъ. — Концы среднихъ и большихъ кроющихъ крыла почти цвѣта спины, такъ что бѣлаго поля на крылѣ нѣтъ. У adlt. подбородокъ, прилежащая часть горла, полоска вдоль середины бѣлаго лба и надглазные полоски, начинающіяся на уздечкахъ, чернаго цвѣта, болѣе интенсивнаго у ♂, чѣмъ у ♀. Клювъ темный и зимою, и лѣтомъ, у молодыхъ б. или м. желтый у основанія. (*P. barbata* PRZEW. 1887).

P. blanfordi (HUME).

a'. Спина въ темныхъ полосахъ, образуемыхъ бурыми внутренними опахалами перьевъ межлопаточной области. Клювъ менѣе массивнѣй и длиннѣе: высота его замѣтно менѣе длины оголеннаго culmen'a, а отрѣзокъ его до линіи, соединяющей уголъ нижней челюсти съ опереніемъ на culmen'ѣ, представляетъ равнобедренный треугольникъ.

b. Концы среднихъ и большихъ кроющихъ крыла цвѣта внѣшняго опахала перьевъ межлопаточной области и не образуютъ на крылѣ бѣлаго поля. На горлѣ слѣды темнаго поля; за глазомъ нѣть и намека на темную полоску. — У adlt. весь лобъ отъ глаза до глаза, уздечки, передняя часть щекъ, подбородокъ и все горло чернаго цвѣта; у ♂ маска эта выражена рѣзче, чѣмъ у ♀. Клювъ и зимою, и лѣтомъ темный съ желтизной у основанія, у juv. въ большей части желтый. (*P. kansuensis* PRZEW. 1887).

P. davidiāna, VERR.

b'. Концы среднихъ и большихъ кроющихъ крыла бѣлые и образуютъ сплошное бѣлое поле на внутренней части крыла. На горлѣ только слѣды темныхъ усиковъ, но середина его и подбородка свѣтлая; за глазомъ явственная черноватая полоска, проходящая по верхней части ушной области. У adlt. уздечки, нижняя часть окружности глазъ и верхняя часть ушной области, а также усы, начинающіяся отъ угловъ рта и идущіе по бокамъ горла чернаго цвѣта. Клювъ почти черный и лѣтомъ, и зимою, у juv. б. или м. желтый у основанія.

P. ruficollis (BLAND.).

43. *Pyrgilauda ruficollis* (BLAND.).

10.660—16.040'. ♂ adlt., 17—27. V. 1900, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой р. с. 14.000'. 2 ♂ adlt., 12—30. VI. 1900, оз. Оринъ-норъ (Русское), истоки Желтой рѣки.